

Samenvatting van duloxetine

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Duloxetine zorgt ervoor dat u zich beter voelt en het maakt u minder angstig. Ook versterkt het de spieren rond de urinebuis en vermindert het pijnklachten.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- depressie
- gevoelens van angst of spanning
- urine-incontinentie
- zenuwpijn
- pijn door fibromyalgie

U merkt niet direct dat u zich beter voelt. Dit duurt een paar weken.

Bij zenuwpijn kunt u het effect na 1 week merken. Bij urine-incontinentie binnen 2 weken en bij pijn door fibromyalgie binnen 3 maanden.

Gebruik

Duloxetine is er als capsule.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de capsule heel door met een half glas water. Niet kauwen.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- misselijk zijn
Heeft u hier veel last van? Neem dit medicijn dan in met wat eten.
- verstopping
- hoofdpijn
- droge mond
- suf, slaperig of duizelig zijn

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Duloxetine heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept koopt? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met duloxetine.



Let op! Gebruikt u dit medicijn al een paar weken? En gaat u stoppen? Stop dan niet in één keer. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



Let op! U kunt last krijgen van suf, slaperig of duizelig zijn. Deze bijwerkingen zijn in het begin het sterkst. Rijd daarom de **eerste week** geen auto. Daarna alleen als u geen last meer heeft van deze bijwerkingen.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.