

# Samenvatting van etoricoxib

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Etoricoxib stilt pijn, remt ontstekingen en verlaagt koorts.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- gewrichtspijn door artrose
- reumatoïde artritis (reuma)
- de ziekte van Bechterew
- jicht
- pijn na een behandeling aan uw gebit

De pijn wordt vanaf 1 uur nadat u dit medicijn heeft ingenomen minder. Daarna werkt het 24 uur. Roodheid en zwelling door ontstekingen worden binnen 1 tot 2 weken minder.

## Gebruik

Etoricoxib is er als tabletten. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een half glas water.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- irritatie van de maag
- buikpijn
- misselijk zijn en overgeven
- zweren (een soort wond) in uw maag en darmen
- bloedingen in uw maag en darmen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

**Let op!** Bent u ouder dan 60 jaar? Of heeft u eerder een maag- of darmzweer gehad? Of gebruikt u bloedverdunners?

Dan heeft u een **maagbeschermer** nodig als u dit medicijn gebruikt. Vraag uw apotheker om advies.

## Waarschuwingen



**Let op!** Etoricoxib en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met etoricoxib.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op** met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Door alcohol heeft u meer kans op maagklachten.



**Let op!** Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby. Let op, u mag dit medicijn in ieder geval **niet** gebruiken bij pijn in de **laatste 3 maanden** van uw zwangerschap.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt en of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.