

Samenvatting van finasteride

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Finasteride zorgt dat het mannelijk hormoon testosteron minder invloed heeft op de prostaat en op de haarzakjes in de huid.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- plasproblemen door een vergrote prostaat.
U merkt na 2 tot 6 maanden of het goed genoeg werkt.
Heeft u na 6 maanden nog steeds plasproblemen? Overleg dan met uw arts.
- **kaalheid bij mannen.**
U merkt na 3 tot 6 maanden dat er een beetje haar groeit op plekken die eerder kaal waren. Als u stopt met finasteride verdwijnen de nieuwe haren weer, binnen een half tot 1 jaar.
- **te veel \aargroe] b]vrou k en.**
Na een paar maanden groeien de haren minder.

Gebruik

Finasteride is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een half glas water.
U gebruikt dit medicijn meestal 1 keer per dag.

Bijwerkingen

Mannen kunnen last krijgen van seksuele problemen, zoals:

- geen stijve penis kunnen krijgen
- minder zin hebben in seks

U kunt hier last van blijven houden, ook als u stopt met het gebruik van dit medicijn.

Bijwerkingen bij vrouwen zijn niet bekend.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn verstoort de normale groei van de baby in uw buik. U mag finasteride ook **niet per ongeluk aanraken**. Bijvoorbeeld als iemand een tablet doormidden breekt of fijnmaakt.



Let op! Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.

Let op! Bij mannen die 5 mg finasteride op een dag innemen, komt dit medicijn in het sperma. Dit kan schadelijk zijn voor de baby. Gebruik daarom condooms. Kan uw partner zwanger worden? Zorg dan dat uw partner anticonceptie gebruikt, zoals de pil.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

