

# Samenvatting van lidocaïne in de mond

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Lidocaïne verdooft uw huid en slijmvliezen. Slijmvlies is huid met een laagje slijm, bijvoorbeeld in uw mond.

Lidocaïne in de mond wordt gebruikt bij pijnlijke aandoeningen in de mond of de slokdarm. Zoals aften (pijnlijke zweertjes in de mond).

Het werkt meteen en het blijft een kwartier tot een half uur werken.

## Gebruik

Lidocaïne in de mond is er als gel en als zuigtablet.

Op het etiket van de apotheek en in de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

### Orale gel:

- **Bij pijn in de mond:** verspreid de orale gel goed in de mond en slik langzaam door.
- **Bij pijn in de slokdarm:** slik de orale gel langzaam door.
- **Bij aften:** met een penseeltje of wattenstaafje op de aften aanstippen.

### Oromucosale gel:

- **Bij pijn in de mond, tandvles of de lippen:** breng de gel aan op de pijnlijke plekken. En wrijf het voorzichtig in.

### Zuigtablet:

- **Bij keelpijn:** langzaam in de mond laten smelten. Niet langer dan 3 dagen gebruiken.

Gebruikt u dit middel om het eten minder pijnlijk te maken? Breng het dan direct voor het eten aan.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Wondjes door per ongeluk bijten op de verdoofde wang of tong.
- Irritatie van de slijmvliezen.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Dit medicijn kan in de moedermelk komen. U kunt dit middel veilig gebruiken als u het korte tijd gebruikt, één of een paar dagen. Of bij het gebruik van de aanstipvloeistof.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

