

Samenvatting van **meloxicam**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Meloxicam werkt bij pijn, remt ontstekingen en verlaagt koorts.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- reumatoïde artritis (reuma)
- de ziekte van Bechterew
- versleten gewrichten (artrose)

Pijn wordt binnen 1,5 uur minder.

Gewrichten worden binnen 1 week minder rood en gezwollen.

Gebruik

Meloxicam is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water.

Slik dit medicijn tijdens het eten. Dan heeft u minder kans op maagklachten.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van maagklachten, zoals:

- buikpijn
- misselijk zijn
- diarree en winderigheid
- vol of verstopt gevoel

Let op! U kunt last krijgen van maagzweren, darmzweren of bloedingen.

- Bent u **ouder dan 70 jaar**?
- Gebruikt u **bloedverdunners**?
- Heeft u **eerder** maagzweren of darmzweren gehad? Dan heeft u maagbeschermer nodig. Vraag dit aan uw arts of apotheker.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts

Waarschuwingen



Let op! Meloxicam en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met meloxicam.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op met alcohol. Alcohol geeft meer kans op maagklachten.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby. U mag dit medicijn **NIET** gebruiken bij pijn in de laatste **3 maanden van uw zwangerschap**.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Het is niet zeker of dit medicijn in de moedermelk komt. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.