

Samenvatting van **midazolam**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Midazolam maakt u rustiger, minder angstig en ontspant uw spieren. Ook stopt het epilepsie aanvallen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- slecht slapen
- epilepsie
- onrust, zoals voor een operatie

Gebruikt u de tabletten? U wordt dan binnen een half uur tot 1 uur slaperig en rustig. U blijft zich een aantal uren rustig voelen.

Gebruikt u dit medicijn voor epilepsie? De neusspray werkt binnen 2 tot 3 minuten.

Gebruik

Midazolam is er als tabletten, drank en neusspray. Dit medicijn wordt soms ook als klysma, infuus of injectie gegeven. Deze tekst gaat alleen over de tabletten, drank en neusspray.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met midazolam

Slik de tabletten met een glas water.

Drank met midazolam

1. Schud het flesje goed.
2. Meet de goede hoeveelheid af met een maatbeker, maatlepel of doseerspuit.
3. Drink deze hoeveelheid op.

Neusspray met midazolam

1. Bij een epilepsie aanval zal iemand anders de neusspray voor u toedienen. Bijvoorbeeld iemand uit uw gezin, uw verzorger of arts.
2. Wordt de neusspray voor het eerst gebruikt? Druk dan eerst het pompje een paar keer in de lucht.
3. Houd uw hoofd rechtop.
4. Breng de tuit in 1 neusgat en druk het andere neusgat dicht. Druk het pompje 1 keer in.

Let op! Gebruikt u dit medicijn omdat u slecht slaapt? Dit medicijn werkt het best als u het af en toe gebruikt. Bijvoorbeeld niet vaker dan 1 keer in de 3 dagen.

Bijwerkingen

U kunt suf, slaperig of moe worden. Ook reageert u minder snel. Daardoor kunt u makkelijk vallen. Deze klachten kunnen tot de volgende dag duren.

Ook kunt u last krijgen van

- slappe spieren
- problemen met uw geheugen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Gebruik midazolam zo kort mogelijk. Als u dit medicijn lang gebruikt, wordt het moeilijk om te stoppen. Gebruikt u dit medicijn langer dan 2 weken achter elkaar? Bouw langzaam af in overleg met uw apotheker of arts.



Let op! Neem geen grapefruit of grapefruitsap als u midazolam gebruikt. Want dan heeft u meer kans op bijwerkingen.



Let op! Gebruikt u:

- elke dag meer dan 15 mg midazolam? Dan mag u niet autorijden.
- af en toe meer dan 15 mg midazolam? Dan mag u steeds 24 uur niet autorijden nadat u dit medicijn heeft gebruikt.
- af en toe minder dan 15 mg midazolam? Dan mag u steeds 8 uur niet autorijden nadat u dit medicijn heeft gebruikt.



Let op! met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

