

# Samenvatting van ondansetron

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Ondansetron zorgt dat u minder het gevoel heeft om steeds te moeten overgeven.

Ook maakt het uw poep steviger.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- erg misselijk zijn en overgeven of om dit te voorkomen.

Zoals bij behandeling van kanker, na een operatie of tijdens de zwangerschap.

- prikkelbaredarmsyndroom met diarree.

Tabletten en drank werken binnen 1 tot 2 uur en blijven 6 tot 8 uur lang werken.

De zetabletten werken binnen 5 tot 6 uur en blijven 1 dag lang werken.

De injectie werkt binnen 15 minuten.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Hoofdpijn
- Maagdarmlachten
- Een gevoel van warmte en opvliegers.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



**Let op!** Bent u zwanger en wilt u dit medicijn gebruiken tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan in deze periode slecht zijn voor de baby in uw buik.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? Het is niet zeker of dit medicijn in de moedermelk komt. En of dit medicijn veilig is voor de baby. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

## Gebruik

Ondansetron is er als tabletten, smelttabletten, drank, zetabletten en injecties.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten met ondansetron

Slik de tablet met een half glas water.

### Smelttabletten met ondansetron

1. Laat de tablet op uw tong smelten.
2. Slik het daarna door.

### Drank met ondansetron

1. Schud de fles voor gebruik.
2. Meet de goede hoeveelheid af met een maatbeker of maatlepel.
3. Drink die hoeveelheid op.
4. Spoel het glas daarna met een beetje water. En drink dat ook op.

### Zetabletten met ondansetron

1. Maak de zetpil een beetje nat.
2. Breng de zetpil in uw anus (poepgat).
3. Duw met een vinger de zetpil helemaal naar binnen.

### Injecties met ondansetron

Injecties worden gegeven door een arts of verpleegkundige.

U gebruikt dit medicijn meestal **1 tot 2 uur voor** de chemokuur of bestraling 1 keer.

De tabletten of drank neemt u op de volgende dagen meestal 2 of 3 keer per dag in.

De zetpil gebruikt u op de volgende dagen 1 keer per dag.

U gebruikt dit medicijn meestal **niet langer dan 5 dagen** per chemokuur of bestraling.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

