

# Samenvatting van salmeterol met fluticason inhalatie

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

**Salmeterol** opent uw luchtwegen.

**Fluticason** remt ontstekingen en beschermt de luchtwegen tegen prikkels die u benauwd maken. Deze combinatie maakt u minder benauwd en voorkomt nieuwe aanvallen van benauwdheid.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- astma
- COPD (chronische obstructieve longziekte)

Binnen 20 minuten na inademen bent u minder benauwd. Daarna werkt het 12 uur lang.

## Gebruik

Salmeterol met fluticason is er als inhalatiepoeder en inhalatiespray. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Dit medicijn zit in een **inhalator**.

Dat is een apparaat om dit medicijn in te ademen. In de apotheek laten ze zien hoe dat moet.

Gebruik dit medicijn **elke dag**. Dan bent u minder vaak benauwd. Dit medicijn helpt niet in situaties waarin u ineens benauwd wordt. Daarvoor heeft u een luchtwegverwijder nodig die snel werkt.

**Let op!** Elke inhalator werkt anders. Dit medicijn werkt alleen als u het goed inademt. Laat daarom elk jaar in de apotheek controleren of u dit medicijn nog op de goede manier inademt.

Bekijk de **video met uitleg** op Apotheek.nl. Daar staat uitleg voor elke soort inhalator. Scan de QR-code om het filmpje te zien voor uw inhalator.



Vindt u het moeilijk om uw inhalator te gebruiken? Er zijn ook andere inhalatoren. Vraag uw arts of apotheek of een ander soort inhalator beter bij u past.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- hoofdpijn
- trillende handen
- hoesten
- hartkloppingen

Deze bijwerkingen verdwijnen meestal binnen een paar uur na inhalatie. Ook zult u minder last hebben van deze bijwerkingen als u dit medicijn langer gebruikt. Heeft u na 2 weken nog steeds deze bijwerkingen? Vraag uw arts dan om advies.

Verder kunt u last krijgen van **klachten in de mond**.

Zoals:

- geïrriteerde mond en keel
- schimmelinfecties in uw mond en keel
- een droge mond
- een vieze smaak
- hees zijn

**Spoel altijd uw mond** nadat u dit medicijn heeft ingeademd. En zorg dat u dit medicijn goed inademt. Dan heeft u minder kans op deze bijwerkingen.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

