

Samenvatting van tamoxifen

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Tamoxifen remt de groei van kanker die gevoelig is voor het hormoon oestrogeen. Het vermindert ook de zwelling van borstklieren. Verder zet het bij vrouwen de eisprong in gang.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- borstkanker
- borstpijn tijdens de menstruatie
- mannen die borsten krijgen als bijwerking van een medicijn
- een verminderde vruchtbaarheid

Gebruik

Tamoxifen is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een half glas water.

Doe dit op een vast tijdstip, bijvoorbeeld in de ochtend bij het ontbijt. Dan vergeet u minder snel een dosis.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- overgangsklachten, zoals opvliegers
- maagklachten
- hoofdpijn
- vocht vasthouden
- huiduitslag (bulten of rode vlekken op huid)
- haaruitval
- wazig zien
- meer kans op trombose. Krijgt u een harde rode pijnlijke plek in uw kuit of wordt u opeens benauwd? Waarschuw dan uw arts.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Tamoxifen en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept heeft gekocht? Laat uw apotheker controleren of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met tamoxifen.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik. U mag **ook niet zwanger** worden terwijl u dit medicijn gebruikt en **tot 9 maanden daarna**.



Let op! Geef **geen borstvoeding** als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Als dit in de moedermelk komt kan het schadelijk zijn voor de baby.