

Samenvatting van tramadol

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Tramadol is een **sterke pijnstiller**.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- erge pijn die onverwacht is of lang duurt. Bijvoorbeeld na een ongeluk, bij een operatie of bij kanker.
- artrose
- vroegtijdige zaadlozing (te vroeg klaarkomen)

Capsules, oplostabletten, bruistabletten en druppels werken binnen 1 uur. Zetpillen werken langzamer. Deze werken 6 tot 8 uur lang.

Tabletten en capsules met gereguleerde afgifte ('retard' of 'MGA') werken 12 uur.

Waarschuwingen



Let op! Als u begint met dit medicijn mag u de **eerste 2 weken** niet autorijden. Als u meer van dit medicijn moet gaan gebruiken mag u weer 2 weken niet autorijden. Daarna mag u alleen autorijden als u niet suf of duizelig bent.



Let op! met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.




Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen. Gebruik dit medicijn niet vlak voor de bevalling.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Dit medicijn kan in een heel kleine hoeveelheid in de moedermelk komen. Gebruik het daarom voor een korte periode als u borstvoeding geeft. Bijvoorbeeld een paar dagen.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- misselijk zijn, overgeven
- suf, slaperig en duizelig zijn
- verstopping
- droge mond
- zweten, hoofdpijn

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Gebruik

Tramadol is er als tabletten, oplostabletten, bruistabletten, capsules, druppels en zetpillen. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten en capsules met tramadol

Slik de tablet of de capsule met een half glas water.

Let op! Gebruikt u de tabletten met vertraagde afgifte? Hier komt tramadol langzaam uit vrij. U mag deze tabletten **niet fijnmaken of kauwen**, anders komt de dosis in één keer vrij. Slik de tablet héél door.

Bruistabletten met tramadol

1. Doe de bruistablet in een half glas water.
2. Wacht tot het bruisen is gestopt en drink het glas leeg.
3. Spoel het glas met water en drink dit ook op.

Oplostabletten met tramadol

1. Laat de tablet uit elkaar vallen in water.
2. Roer en drink op.
3. Spoel het glas met water en drink dit ook op.

Druppels met tramadol

1. Druppel het voorgeschreven aantal druppels in een glas water.
2. Drink dit op.
3. Spoel het glas na met water en drink dit ook op.

Zetpillen met tramadol

1. Maak de zetpil een beetje nat.
2. Breng de zetpil in uw anus (poepgat).

Gebruik tramadol zolang u het nodig heeft en volgens een vast schema.