

Samenvatting van tranexaminezuur

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Tranexaminezuur voorkomt bloedingen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- bloedingen
- gevaar voor bloedingen, zoals bij mensen met een bloedstollingsziekte of bij een operatie
- te veel bloeden tijdens ongesteld zijn
- hereditair angio-oedeem (een erfelijke ziekte met zwellingen in uw gezicht, slokdarm, buik, keel en mondholte)
- donkere huidverkleuring

Gebruik

Tranexaminezuur is er als tabletten en mondspoeling. Dit medicijn is er ook als injectie. Deze tekst gaat alleen over de tabletten en mondspoeling.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met tranexaminezuur

Slik de tabletten heel door met water. Heeft u moeite met slikken? U mag ook de tablet op de breukstreep doormidden breken. De beide helften moet u daarna heel doorslikken.

Mondspoeling met tranexaminezuur

1. Meet met de doseerspuit de goede hoeveelheid af.
2. Spoel hiermee 2 minuten lang uw mond.
3. Spuug de mondspoeling daarna uit. Slik het **NIET** door.

Er is ook een **mondspoeling** met tranexaminezuur die u **wel mag doorslikken**. Maar doe dit alleen als uw arts dit zegt.

1. Meet hiervoor met de maatbeker of doseerspuit de goede hoeveelheid af.
2. Slik deze hoeveelheid daarna meteen door.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- misselijk zijn en overgeven
- diarree

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

