

Samenvatting van **trazodon**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Trazodon zorgt voor een betere stemming. Het helpt ook tegen onrust, prikkelbaar zijn bij dementie en moeite met slapen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- depressie
- dementie
- moeite met slapen. Zoals bij angst na een schokkende gebeurtenis (posttraumatische stressstoornis, PTSS) of in de laatste levensfase.

U merkt binnen 2 tot 4 weken dat dit medicijn werkt.

Gebruik

Trazodon is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tablet met een half glas water.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- suf, slaperig of duizelig zijn en trager reageren. Deze bijwerkingen zijn in het begin het sterkst. Heeft u hier last van? Neem dit medicijn dan voor u gaat slapen.
- zwaarder worden. Let goed op wat u eet. Overleg als het nodig is met een diëtist.
- opvliegers
- veel zweten
- misselijk voelen en zuurbranden
- in zeldzame gevallen bloedafwijkingen. Heeft u koorts, blaren in uw mond en keelpijn? Waarschuw dan direct uw arts.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



Let op!

- Rijd **géén auto** als u **elke dag meer dan 25 mg** trazodon gebruikt.
- Gebruikt u **af en toe meer dan 25 mg**? Dan mag u 2 dagen (48 uur) nadat u trazodon heeft ingenomen niet autorijden.
- Gebruikt u **25 mg of minder** op een dag? Dan mag u 11 uur nadat u trazodon heeft ingenomen niet autorijden.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Dit kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.