

Samenvatting van valproïnezuur

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Valproïnezuur brengt overprikkelde zenuwen in de hersenen tot rust.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- epilepsie
- manie (u heeft veel energie, heeft weinig slaap nodig en bent veel blij)"
8it hoort bij de ziekte bipolaire stoornis"
- migraine
- hik die niet overgaat

U merkt pas na een paar weken of het goed bij u werkt. Behalve bij hik, dit moet snel minder worden.

Gebruik

Valproïnezuur is er als tabletten, korrels, drank, druppels en zetpillen. Dit medicijn wordt ook in het ziekenhuis gegeven als injectie. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met valproïnezuur

Slik de tablet heel door met een half glas water. Niet kauwen.

Let op! Gebruikt u de tablet met vertraagde afgifte? Ook deze tabletten mag u niet fijnmaken of kauwen. Anders komt de dosis in één keer vrij. U mag deze tabletten wel op de breukstreep breken.

Druppels met valproïnezuur

1. Meet de juiste hoeveelheid af met het doseerspuitje.
2. Meng dit met een half glas water of limonade en neem dit in.

Drank met valproïnezuur

1. Meet de juiste hoeveelheid af met een maatbeker of spuit.
2. Drink die hoeveelheid op.

Korrels met valproïnezuur

1. Doe de korrels op een lepel met zacht eten. Zoals yoghurt, appelmoes of kwark.
2. Eet dit op.

Zetpillen met valproïnezuur

Doe de zetpil in de anus (poepgat). Dit mag met de punt naar voren of met de stompe kant naar voren.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- misselijk zijn. U heeft hier minder last van als u dit medicijn met wat eten neemt.
- slaperig zijn
- duizelig zijn
- in de war zijn

In het begin van de behandeling heeft u minder kans op bijwerkingen als u een korte tijd minder medicijn gebruikt. Uw arts vertelt hoe lang dat is.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



Let op! U mag in de eerste week niet autorijden. Nadat u 1 week lang dezelfde dosering heeft gebruikt mag u weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen bijwerkingen heeft.



Let op! met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Dit kan u nog suffer maken.



Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Dit medicijn is slecht voor de baby in uw buik.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Dit medicijn kan in kleine hoeveelheden in de moedermelk komen, maar dit is niet schadelijk voor de baby. U kunt veilig borstvoeding geven. Controleer de baby goed op niet goed willen drinken, overgeven, suf zijn en prikkelbaarheid.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

