

# Samenvatting van varenicline

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Varenicline zorgt ervoor dat u minder zin heeft in roken.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij rookverslaving.

U moet dit medicijn meestal 3 tot 6 maanden gebruiken.

## Gebruik

Varenicline is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water.

In het begin van de behandeling gebruikt u een korte tijd minder medicijn. Pas daarna mag u meer varenicline in gaan nemen. Uw arts vertelt u wanneer dat is.

Stop pas met roken nadat u dit medicijn 1 week heeft gebruikt. Het kan ook iets later, maar in elk geval binnen 5 weken.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Hoofdpijn
- Misselijk zijn. Bent u misselijk? Neem dit medicijn dan in met wat eten.
- Slaperig, moe of duizelig zijn
- Moeite hebben met de coördinatie van bewegingen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



Varenicline en andere medicijnen hebben geen invloed op elkaar. Maar als u stopt met roken, kan dit wel invloed hebben op de medicijnen die u slikt. Overleg met uw arts voordat u gaat stoppen met roken.



**Let op!** Bent u slaperig, moe of duizelig? Of heeft u moeite met de coördinatie van bewegingen? Dan mag u niet autorijden.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden. Gebruik dit medicijn alleen onder begeleiding van een arts of een stoppen-met-roken begeleider.



**Let op!** Geef **geen** borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

