

Samenvatting van verapamil

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Verapamil maakt uw bloedvaten wijder en verlaagt uw bloeddruk. Het zorgt ervoor dat uw hart meer zuurstof krijgt en dat uw hart regelmatig gaat kloppen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- angina pectoris (pijnlijk en drukkend gevoel op uw borst)
- hartritmestoornissen
- hoge bloeddruk
- om een hartaanval te voorkomen
- clusterhoofdpijn

Bij een pijnlijk en drukkend gevoel op de borst heeft u binnen 2 uur minder last van pijn.

Gebruik

Verapamil is er als tabletten. Dit medicijn is er ook als injectie. Deze tekst gaat alleen over de tabletten. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water.

Let op! Gebruikt u tabletten met vertraagde afgifte (retard of MGA)? Hier komt verapamil langzaam uit vrij. U mag deze tabletten **niet fijnmaken of kauwen**. Anders komt dit medicijn in één keer vrij. Slik de tablet héél door.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- verstopping
- duizelig voelen
- langzamere hartslag
- hoofdpijn
- opvliegers
- blozen
- dikke enkels en onderbenen

De meeste bijwerkingen gaan binnen een paar weken vanzelf over. Blijft u veel last houden van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Neem geen grapefruit of grapefruitsap als u verapamil gebruikt. Want dan heeft u meer kans op bijwerkingen.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

