

Samenvatting van **zopiclon**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Zopiclon is een slaapmiddel.

Uw arts schrijft dit medicijn voor als u problemen heeft met slapen.

U wordt binnen 1 uur slaperig en rustig.
Het werkt 6 tot 8 uur lang.

Gebruik

Zopiclon is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water.

Dit medicijn werkt het best als u het **af en toe** gebruikt.
Bijvoorbeeld **niet vaker dan 1 keer in de 3 dagen**.
En **niet langer dan 2 weken** achter elkaar.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- suf, slaperig of moe zijn
- minder snel reageren
- bittere smaak
- een droge mond
- geheugenproblemen
- een leeg gevoel

Deze bijwerkingen duren tot de volgende dag.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Als u zopiclon elke dag gebruikt, wordt het moeilijk om te stoppen.

Gebruik dit medicijn daarom zo kort mogelijk. Heeft u het langer dan 1 week achter elkaar gebruikt? Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



Let op!

- Gebruikt u **7,5 mg of minder** zopiclon per dag? Dan mag u **16 uur niet rijden** nadat u zopiclon heeft gebruikt.
- Gebruikt u **meer dan 7,5 mg** zopiclon per dag? Dan mag u **24 uur niet rijden** nadat u zopiclon heeft gebruikt.



Let op met alcohol. Dit kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts of apotheker. U kunt dit medicijn **beter NIET voor lange tijd gebruiken** als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt een klein beetje in de moedermelk. Het dat kan bijwerkingen bij het kind geven.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

