

Medicijn in het kort voor **Azitromycine**

Drank om **een MAC-infectie te voorkomen**

Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij mensen met een HIV-infectie om te voorkomen dat ze een infectie met de MAC-bacterie krijgen.

Hoe werkt dit medicijn?

Dit medicijn doodt bacteriën (antibioticum).

Als u dit medicijn gebruikt heeft u **50% minder kans op een ontsteking** met een MAC-bacterie.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.

Shudden voor gebruik.

Gebruik een maatlepel of doseerspuit om de goede hoeveelheid te bepalen.



Neem de drank tijdens of na het eten in. Wordt u misselijk van dit medicijn? Neem de drank dan in met wat eten.



De drank smaakt best bitter. Drink daarom nog een glas water of vruchtensap.



vast tijdstip

Kies een vaste dag en tijd waarop u dit medicijn inneemt. Dan vergeet u minder snel een drank.



vergeten

Bent u dit medicijn vergeten in te nemen? Duurt het **meer dan 24 uur** tot u de volgende drank inneemt? Neem de vergeten drank dan direct in. Duurt het **minder dan 24 uur**? Sla de vergeten drank dan over. U neemt deze vergeten drank alsnog aan het einde van de kuur.

Let op!



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.



Bent u zwanger? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn kunt gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Geeft u borstvoeding? U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft.

Belangrijkste waarschuwingen

Bacteriën kunnen resistent worden voor dit medicijn. Dit betekent dat bacteriën niet meer gevoelig zijn voor het medicijn. Het is belangrijk dat dit niet gebeurt. Gebruik dit medicijn daarom op de juiste manier.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Misselijk zijn, maagpijn of buikpijn. Heeft u hier last van? Neem dit medicijn dan in met wat eten.
- Diarree. Heeft u hier last van? Drink dan voldoende water, anders raakt u uitgedroogd.
- Duizelig zijn.
- Smaken niet goed proeven.
- Een tintelend gevoel in uw handen of voeten.
- Problemen met slapen.
- Minder goed kunnen zien en horen.
- Huiduitslag.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Bewaar dit medicijn niet in de koelkast of de vriezer.

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl en apotheek.nl of vraag uw arts of apotheker.