

Medicijn in het kort voor **Azitromycine**

Tabletten bij **infecties met bacteriën**

Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij infecties. Zoals infecties van de longen, luchtpijp, keel, bijholtes, middenoor en huid.

Hoe werkt dit medicijn?

U heeft een ontsteking door een bacterie. Dit medicijn doodt bacteriën (antibioticum).

U heeft meestal **binnen een paar dagen minder klachten**.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.



Neem de tablet in met een half glas water.



Neem de tablet tijdens of na het eten in. Wordt u misselijk van dit medicijn? Neem de tablet dan in met wat eten.



vast tijdstip

Kies een vast tijdstip waarop u de tablet inneemt. Dan vergeet u minder snel een tablet.

Maak de hele kuur af. Ook als u denkt dat u beter bent. Er kunnen nog bacteriën in uw lichaam zitten.



vergeten

Bent u de tablet vergeten in te nemen? U neemt de tablet 1 keer per dag. Duurt het **meer dan 8 uur** tot u de volgende tablet moet innemen? Neem de vergeten tablet dan direct in. Duurt het **minder dan 8 uur** tot u de volgende tablet moet innemen? Sla de vergeten tablet dan over. U neemt deze vergeten tablet alsnog aan het einde van uw kuur.

Let op!



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.



Bent u zwanger? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn kunt gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Geeft u borstvoeding? U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft.

Belangrijkste waarschuwingen



afmaken

Bacteriën kunnen resistent worden voor dit medicijn. Dit betekent dat bacteriën niet meer gevoelig zijn voor het medicijn. Het is belangrijk dat dit niet gebeurt. Gebruik dit medicijn daarom op de juiste manier en maak de kuur af.



Zijn uw klachten na **3 dagen** niet minder of juist erger? Neem dan contact op met uw arts.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Misselijk zijn, maagpijn of buikpijn. Heeft u hier last van? Neem dit medicijn dan in met wat eten.
- Diarree. Heeft u hier last van? Drink dan voldoende water, anders raakt u uitgedroogd.
- Duizelig zijn.
- Smaken niet goed proeven.
- Een tintelend gevoel in uw handen of voeten.
- Problemen met slapen.
- Minder goed kunnen zien en horen.
- Huiduitslag.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl en apotheek.nl of vraag uw arts of apotheker.