

Vaccin in het kort voor het **BMR-vaccin**

Waarvoor is dit vaccin?

Dit vaccin beschermt uw kind tegen verschillende ziektes:

- **De bof.** Uw kind kan een ontsteking krijgen van de speekselklieren of van het vlies rond de hersenen (hersenvliesontsteking). Bij bof kan uw kind ook last krijgen van een dikke wang en pijn bij kauwen en slikken.
- **Mazelen.** Uw kind kan last krijgen van koorts, hoesten en verkoudheid. Na een paar dagen krijgt uw kind rode vlekken op de huid. Ook kan uw kind een ontsteking van de longen of van de hersenen krijgen. Mazelen kan ook blijvende klachten geven. Zoals doof zijn en schade aan de hersenen. Door schade aan de hersenen kan uw kind bijvoorbeeld moeilijker lopen of kan uw kind last krijgen van ernstige hoofdpijn.
- **Rodehond.** Uw kind kan soms last krijgen van koorts en huiduitslag krijgen over het hele lichaam. Ook kan uw kind gezwollen klieren in de hals krijgen.

Hoe werkt dit vaccin?



Na de vaccinatie herkent het lichaam van uw kind de virussen die bof, mazelen en rodehond veroorzaken.

Komt uw kind na de vaccinatie in contact met de virussen die zorgen voor deze ziektes? Dan kan het lichaam snel antistoffen aanmaken die uw kind beschermen. **Hierdoor wordt uw kind niet ziek of veel minder ziek.**

Wanneer krijgt mijn kind dit vaccin?



Uw kind krijgt dit vaccin **2 keer**. In het schema van het Rijksvaccinatieprogramma is dit als uw kind 14 maanden oud is en in het jaar dat uw kind 9 jaar wordt.

Het kan zijn dat uw kind een aangepast schema krijgt. Volg altijd het schema van uw kind.



Uw kind krijgt de prik in het bovenbeen of de bovenarm.

Deze vaccinatie is onderdeel van het **Rijksvaccinatieprogramma**. Dit is een programma van de overheid om mensen te beschermen tegen besmettelijke ziektes. De vaccinaties die onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma zijn gratis.

Wat moet ik doen als mijn kind de vaccinatie niet heeft gehad?



Heeft uw kind de afspraak voor de vaccinatie gemist? Maak zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

Belangrijkste waarschuwingen



Heeft uw kind **koorts** voordat het de vaccinatie krijgt? Uw kind kan dan nog zieker worden.

Advies RIVM: Maak een nieuwe afspraak voor de vaccinatie als uw kind meer dan 38,5 graden koorts heeft.

Heeft uw kind een **lichte infectie**? Zoals een verkoudheid? Overleg met uw arts of u een nieuwe afspraak moet maken voor de vaccinatie.

Belangrijkste bijwerkingen

Net zoals bij andere vaccins kan uw kind last krijgen van bijwerkingen. De meeste bijwerkingen krijgt uw kind omdat dit vaccin ervoor zorgt dat de afweer van uw kind gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen bof, mazelen en rodehond.

Ongeveer 1 op de 10 kinderen krijgt last van:

- Pijn, rood of dikker worden van de huid op de plek van de prik.
- Koorts.

Ongeveer 1 op de 100 kinderen krijgt last van:

- Een blauwe plek op de plek van de prik.
- Huiduitslag.

Meer weten?

Heeft u vragen of twijfels over het vaccineren van uw kind? Bespreek deze dan met de jeugdarts, uw arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiters op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl). Of kijk voor meer informatie op [apotheek.nl](https://www.apotheek.nl), [thuisarts.nl](https://www.thuisarts.nl) of [rijksvaccinatieprogramma.nl](https://www.rijksvaccinatieprogramma.nl). Wilt u een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op [lareb.nl](https://www.lareb.nl).