

# Samenvatting van **budesonide inhalatie**

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Budesonide remt ontstekingen. Budesonide inhalatie beschermt tegen prikkels die u benauwd maken.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- astma
- de longziekte COPD

Binnen 10 dagen voelt u zich minder benauwd. Soms duurt dit een paar weken tot maanden.

## Gebruik

Budesonide zit in een **inhalator**.

Dat is een apparaat om dit medicijn mee in te ademen. In de apotheek laten ze zien hoe dat moet.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken. Gebruik dit medicijn **elke dag**. Dan bent u minder vaak benauwd.

**Let op!** Gebruikt u naast budesonide nog een ander medicijn via een inhalator? Gebruik dat medicijn dan eerst en gebruik daarna budesonide.

**Let op!** Elke inhalator werkt anders. Dit medicijn werkt alleen als u het goed inademt. Laat daarom elk jaar in de apotheek controleren of u dit medicijn nog op de goede manier inademt.

Bekijk de **video met uitleg** op Apotheek.nl. Daar staat uitleg voor elke soort inhalator. Scan de QR-code om het filmpje te zien voor uw inhalator.

Vindt u het moeilijk om uw inhalator te gebruiken? Er zijn ook andere inhalatoren. Vraag uw arts of apotheek of een andere inhalator beter bij u past.



## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- schimmel in uw mond
- hees zijn
- droge mond
- keelpijn
- vieze smaak

**Spoel altijd uw mond** nadat u dit medicijn heeft ingeademd.

Dan heeft u minder kans op deze bijwerkingen.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

