

Samenvatting van bupropion

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Bupropion zorgt ervoor dat u minder zin heeft in roken. Ook zorgt het voor een betere stemming. En het maakt u rustig.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- rookverslaving
- depressie
- ADHD. U bent dan snel afgeleid, doet drukker, en doet dingen zonder er bij na te denken.

Bij rookverslaving merkt u na 1 week dat dit medicijn werkt. Bij depressie en ADHD voelt u na 2 tot 4 weken of het helpt.

Gebruik

Bupropion is er als tabletten met een vertraagde afgifte. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water.

Let op! De tabletten **niet fijnmaken of kauwen**.

Anders komt de dosis in één keer vrij. Slik de tablet heel door.

Gebruikt u dit medicijn 1 keer op een dag? Neem het dan in de ochtend. Dan heeft u minder last van slecht slapen.

Gebruikt u het medicijn 2 keer op een dag? Neem het dan in de ochtend en aan het einde van de middag.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- problemen met slapen
- droge mond
- maagdarmlachten, zoals misselijk zijn en buikpijn
- hoofdpijn

Deze klachten gaan meestal na een paar dagen over. Blijft u veel last houden van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Gebruikt u bupropion al een paar weken? Stop dan niet in één keer. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



Let op! Begint u net met dit medicijn of is uw dosering net verhoogd? Dan mag u een week niet autorijden.



Let op! met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Overleg met uw arts of u dit medicijn mag gebruiken.



Let op! Geef **geen** borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

