

# Medicijn in het kort voor **Ciprofloxacin**

## Drank bij **gonorroe**

### Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij gonorroe (druiper). U krijgt gonorroe door een bacterie. U kunt deze bacterie krijgen door seksueel contact.

### Hoe werkt dit medicijn?

Gonorroe is een ontsteking door bacteriën. Dit medicijn doodt bacteriën (antibioticum). U heeft **binnen een paar dagen minder klachten**.

### Belangrijkste waarschuwingen



Bacteriën kunnen resistent worden voor dit medicijn. Dit betekent dat bacteriën niet meer gevoelig zijn voor het medicijn. Het is belangrijk dat dit niet gebeurt. Gebruik dit medicijn daarom op de juiste manier en maak de kuur af.



Kom niet in fel zonlicht en ga niet onder de zonnebank als u dit medicijn gebruikt. U kunt last krijgen van jeuk, een rode huid en ernstige verbranding. Ook kunt u last krijgen van huiduitslag en verkleuring van de huid.

U bent nog 1 week besmettelijk. U mag daarom 1 week geen seks hebben. Ook niet met condoom.



Zijn uw klachten na **3 dagen** niet minder of juist erger? Neem dan contact op met uw arts.

### Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiters hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.

#### Schudden voor gebruik.

Gebruik een maatbeker, maatlepel of doseerspuit om de goede hoeveelheid te bepalen.

#### Niet kauwen op de korrels in de drank.

Eet en drink geen melk, yoghurt of kaas (zuivel). Dit medicijn werkt dan minder goed. Heeft u toch zuivel gegeten of gedronken? Wacht dan 2 uur tot u dit medicijn inneemt. Wacht nadat u dit medicijn heeft ingenomen 4 uur met zuivel eten of drinken.

Neem dit medicijn goed verdeeld over de dag in. Het werkt dan beter.



vergeten

Bent u dit medicijn vergeten? U neemt de drank 2 keer per dag. Duurt het **meer dan 4 uur** tot u dit medicijn weer moet innemen? Neem dit medicijn dan direct in. Duurt het **minder dan 4 uur**? Sla dit medicijn dan over. U neemt de vergeten drank alsnog aan het einde van de kuur.

### Let op!



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.



Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby in uw buik.



Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

### Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Misselijk zijn of diarree. Heeft u diarree? Drink dan voldoende water, anders raakt u uitgedroogd. Waarschuw bij ernstige diarree uw arts.

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Ontsteking van een pees (bijvoorbeeld in de hiel), spierpijn of gewrichtspijn. Neem dan contact op met uw arts.

### Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of uw medicijnkastje kunt bewaren. Bewaar het niet in de vriezer.

### Meer weten?

Kijk op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](http://geneesmiddeleninformatiebank.nl) en [apotheek.nl](http://apotheek.nl) of vraag uw arts of apotheker.