

Samenvatting van ciprofloxacin

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Ciprofloxacin is een antibioticum. Het werkt tegen infecties met bacteriën.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij infecties van onder andere:

- Blaas, prostaat en nieren
- Luchtwegen
- Oren, huid, botten, darmen en het hersenvlies

Dit medicijn werkt ook bij de volgende infecties:

- Q-koorts
- Geslachtsziekten, zoals gonorrhoe

U heeft na een paar dagen minder last van de klachten.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Misselijk zijn en diarree.
- Peesontsteking, bijvoorbeeld in de hiel.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Heeft u diarree? **Drink dan genoeg water.** Anders raakt u uitgedroogd.

Let op! Bel uw arts meteen als u last krijgt van:

- erge diarree met kramp in de buik
- meer keren per dag diarree met overgeven en koorts

Let op! U kunt **allergisch** zijn voor dit medicijn. Let op of u erge klachten krijgt, zoals:

- blaren op uw huid, benauwd zijn, een zwelling van uw gezicht of flauwvallen

Stop dan met dit medicijn en bel meteen uw arts.

Bent u allergisch voor ciprofloxacin? Meld dit dan bij uw apotheker.

Let op! U kunt een **zonneallergie** krijgen.

Ga niet in de zon tussen **10:00 uur en 15:00 uur**. Ga niet onder de zonnebank. Bescherm u zelf altijd met een zonnebrandmiddel met hoge factor.

Gebruik

Ciprofloxacin is er als tabletten en drank. Dit medicijn wordt ook in het ziekenhuis gegeven als infuus. Deze tekst gaat alleen over de tabletten en drank.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Een kuur duurt meestal **3 dagen tot 3 weken**.

Dit hangt af van de infectie die u heeft en hoe erg deze infectie is.

Tabletten met ciprofloxacin

1. Slik de tabletten heel met een half glas water. Niet kauwen.
2. Verdeel de tabletten over de dag. Dit medicijn werkt dan beter.

Drank met ciprofloxacin

1. Schud het flesje goed.
2. Meet de goede hoeveelheid af met een maatlepel of maatbeker.
3. Slik deze hoeveelheid door.
4. Spoel de maatlepel of maatbeker na met water. Drink dat ook op.
5. Verdeel de drank over de dag. Dit medicijn werkt dan beter.

Let op! Neem dit medicijn **niet met melk of een ander zuivel drank**. Eet er ook **geen yoghurt of kaas** bij. Calcium of 'kalk' in de zuivel zorgt er voor dat dit medicijn minder goed werkt

Samenvatting van ciprofloxacin

Waarschuwingen



Let op! Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog bacteriën.



Let op! Ciprofloxacin en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met ciprofloxacin.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby. U mag dit medicijn in ieder geval **niet** gebruiken in de laatste 6 maanden van uw zwangerschap.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

