

# Medicijn in het kort voor **Ciprofloxacin**

## Tabletten bij **infecties met bacteriën**

### Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij:

- Infecties van de blaas, prostaat en nieren
- Luchtweginfecties en oorontsteking
- Infecties van de huid, botten en hersenvlies

### Hoe werkt dit medicijn?

U heeft een ontsteking door een bacterie. Dit medicijn doodt bacteriën (antibioticum). U heeft meestal **na een paar dagen minder klachten**.

### Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiters hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.



Neem de tablet in met een half glas water.  
**Niet kauwen.**

Eet en drink geen melk, yoghurt of kaas (zuivel). Dit medicijn werkt dan minder goed. Heeft u toch zuivel gegeten of gedronken? Wacht dan 2 uur tot u dit medicijn inneemt. Wacht nadat u dit medicijn heeft ingenomen 4 uur met zuivel eten of drinken.

Neem dit medicijn goed verdeeld over de dag in. Het werkt dan beter.



vergeten

Bent u dit medicijn vergeten? U neemt dit medicijn 2 keer per dag. Duurt het **meer dan 4 uur** tot u dit medicijn weer moet innemen? Neem de vergeten tablet dan direct in. Duurt het **minder dan 4 uur**? Sla dit medicijn dan over. U neemt de vergeten tablet alsnog aan het einde van de kuur.

### Let op!



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.



Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby in uw buik.



Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

### Belangrijkste waarschuwingen



afmaken

Bacteriën kunnen resistent worden voor dit medicijn. Dit betekent dat bacteriën niet meer gevoelig zijn voor het medicijn. Het is belangrijk dat dit niet gebeurt. Gebruik dit medicijn daarom op de juiste manier en maak de kuur af.



Kom niet in fel zonlicht en ga niet onder de zonnebank als u dit medicijn gebruikt. U kunt last krijgen van jeuk, een rode huid en ernstige verbranding. Ook kunt u last krijgen van huiduitslag en verkleuring van de huid.



Zijn uw klachten na **3 dagen** niet minder of juist erger? Neem dan contact op met uw arts.

### Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Misselijk zijn of diarree. Heeft u diarree? Drink dan voldoende water, anders raakt u uitgedroogd. Waarschuw bij ernstige diarree uw arts.

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Ontsteking van een pees (bijvoorbeeld in de hiel), spierpijn of gewrichtspijn. Neem dan contact op met uw arts.

### Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of uw medicijnkastje kunt bewaren.

### Meer weten?

Kijk op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](http://geneesmiddeleninformatiebank.nl) en [apotheek.nl](http://apotheek.nl) of vraag uw arts of apotheker.