

# Samenvatting van codeïne

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Codeïne werkt tegen hoest. Het is ook een pijnstiller.

Uw arts schrijft het voor bij:

- kriebelhoest
- diarree
- pijn

Codeïne werkt binnen een half uur.  
Het werkt 3 tot 4 uur lang.

## Gebruik

Codeïne is er als tabletten en drank.  
Op het etiket van de apotheek en in de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten met codeïne

Slik de tabletten met een half glas water.

### Drank met codeïne

Meet de drank af met het maatbekertje.

**Let op!** Wacht **6 uur** voordat u weer codeïne neemt.  
Gebruik dit medicijn **niet vaker dan 4 keer per dag**.

### Hoelang?

#### Bij hoest of diarree:

Gebruik dit medicijn totdat uw klachten weg zijn.  
Dit is meestal binnen een paar dagen.

#### Bij kriebelhoest:

Heeft u na 2 weken nog steeds kriebelhoest?  
Vraag dan uw arts wat u moet doen.

#### Bij pijn:

Gebruik het zo kort mogelijk.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- verstopping
- suf en slaperig voelen
- duizelig zijn

Heeft u last van verstopping? Eet vezelrijke voeding en drink veel.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** Wordt u suf, slaperig of duizelig van dit medicijn? Rijd dan géén auto.

Gebruikt u meer dan **20 milligram codeïne per keer?** Of gebruikt u codeïne **vaker dan 3 keer per dag?** Dan mag u de **eerste 2 weken NIET autorijden**. Rijd daarna alleen als u niet suf, slaperig of duizelig bent.



**Let op!** met alcohol als u codeïne gebruikt.  
Alcohol kan u nog suffer maken.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u codeïne mag gebruiken.



**Let op!** Geef **géén** borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Codeïne komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.



Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

