

Medicijn in het kort voor **Codeïne**

Drank bij **kriebelhoest**

Waarvoor is dit medicijn?

U kunt dit medicijn gebruiken bij kriebelhoest.

Hoe werkt dit medicijn?

Dit medicijn **maakt uw kriebelhoest minder**. U heeft meestal binnen een half uur minder last van kriebelhoest. Dit medicijn werkt 3 tot 4 uur lang. Uw kriebelhoest is meestal binnen een paar dagen over.

Belangrijkste waarschuwingen



Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. Vraag aan uw apotheker of u dit medicijn veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen. Ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.

Gebruik dit medicijn niet als u slijm ophoest.

Let op! Er zit alcohol in dit medicijn.

Hoe lang gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn tot u geen klachten meer heeft. Dit is meestal binnen een paar dagen. Heeft u na **2 weken** nog steeds klachten? Ga dan naar uw arts.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.

Dit medicijn is alleen bedoeld voor kinderen **vanaf 12 jaar** en volwassenen.

Kinderen van 12 jaar tot 18 jaar:

Slik maximaal 4 keer per dag 20 ml. Kinderen die klachten met de ademhaling hebben mogen dit medicijn niet gebruiken.

Volwassenen:

Slik maximaal 4 keer per dag 20 ml.

Gebruik een maatbeker om de goede hoeveelheid te bepalen.

Neem de drank in op een **lege maag**. Het werkt dan het snelst. U mag de drank ook met eten innemen. De drank begint dan later te werken.

Heeft u snel last van uw maag? Neem de drank dan in na wat eten.

Gebruik dit medicijn als u last heeft van kriebelhoest of dit verwacht te krijgen.

Heeft u last van kriebelhoest als u gaat slapen? Neem de drank dan 1 uur voor u gaat slapen in.



Bent u de drank vergeten in te nemen? Het is niet erg als u de drank 1 keer vergeet. Neem de vergeten drank direct in. **Wacht in ieder geval 6 uur** tot u de volgende drank inneemt.

Let op!



Rijd geen auto als u suf, slaperig of duizelig bent. Gebruikt u dit medicijn vaker dan 3 keer per dag? Dan mag u de eerste twee weken niet autorijden. Rijd daarna alleen als u geen bijwerkingen meer heeft.



Wees voorzichtig met alcohol drinken. Dit kan u nog suffer maken.



Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Suf zijn, slaperig zijn of duizelig zijn.
- Verstopping. Drink veel water. Eet veel vezels, zoals groente, fruit en volkorenproducten. U kunt ook een laxemiddel gebruiken.

Ongeveer 1 op de 1000 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Langzaam ademen, in de war zijn, kleine pupillen, misselijk zijn en moeilijk kunnen plassen.



Heeft u hier last van? Neem dan direct contact op met uw arts.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur en in het doosje. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl en apotheek.nl of vraag uw arts of apotheker.