

Medicijn in het kort voor **Codeïne**

Tabletten bij **pijn**

Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij pijn.

Hoe werkt dit medicijn?

Dit medicijn is een pijnstiller.

Het maakt uw pijn minder. U heeft meestal binnen een half uur minder pijn. Dit medicijn werkt 3 tot 4 uur lang.

Belangrijkste waarschuwingen



Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. Vraag aan uw apotheker of u dit medicijn veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen. Ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.

Gebruik dit medicijn niet als u slijm ophoest.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.



Neem de tablet in met een half glas water.

Neem de tablet bij voorkeur in op een **lege maag**. Dus een half uur voor het eten of 2 uur na het eten. Het werkt dan het snelst. U mag de tablet ook met eten innemen. De tablet begint dan later te werken.

Heeft u snel last van uw maag? Neem de tablet dan in na wat eten.

Gebruik dit medicijn zo kort mogelijk.

Neem dit medicijn goed verdeeld over de dag in. Het werkt dan beter.



vergeten

Bent u de tablet vergeten in te nemen? Het is niet erg als u de tablet 1 keer vergeet. Neem de vergeten tablet direct in.

Wacht in ieder geval 4 uur tot u de volgende tablet inneemt.

Let op!



Rijd geen auto als u suf, slaperig of duizelig bent. Gebruikt u meer dan 20 mg per keer? Of gebruikt u dit medicijn vaker dan 3 keer per dag? Dan mag u de eerste twee weken niet autorijden. Rijd daarna alleen als u geen bijwerkingen meer heeft.



Wees voorzichtig met alcohol drinken. Dit kan u nog suffer maken.



Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Suf zijn, slaperig zijn of duizelig zijn.
- Verstopping. Drink veel water. Eet veel vezels, zoals groente, fruit en volkorenproducten. U kunt ook een laxeermiddel gebruiken.

Ongeveer 1 op de 1000 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Langzaam ademen, in de war zijn, kleine pupillen, misselijk zijn en moeilijk kunnen plassen.



Heeft u hier last van? Neem dan direct contact op met uw arts.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur en in het doosje. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl en apotheek.nl of vraag uw arts of apotheker.