

Samenvatting van colchicine

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Colchicine remt ontstekingsreacties.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- bij jicht
- bij een ontsteking van het hartzakje
- om een hartinfarct te voorkomen
- bij 'familiaire mediterrane koorts'. Dit is een aangeboren aandoening met koortsaanvallen en buikpijn

Bij een jichtaanval merkt u na ongeveer 12 uur dat de pijn minder wordt.

Gebruik

Colchicine is er als tabletten.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Let op! De dosering luistert nauw en verschilt van persoon tot persoon. Neem nooit een dubbele dosis.

Slik de tablet met een glas water.

Gebruik colchicine bij een jichtaanval meteen zodra u de aanval voelt opkomen. Dan werkt het het best.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- branderig gevoel in de keel
- misselijk zijn
- overgeven
- bloederige diarree

Waarschuw dan direct een arts. Misschien heeft u te veel colchine ingenomen.

Verder kunt u last krijgen van:

- buikpijn
- diarree

Neem dan ook contact op met uw arts. Misschien moet de dosering worden aangepast.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Neem geen grapefruit of grapefruitsap als u colchicine gebruikt. Want dan heeft u meer kans op bijwerkingen.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.

Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Want alcohol geeft een grotere kans op een jichtaanval.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.