

نبذة مختصرة عن لقاح - كوميرانتى (فايزر/بيوانتك) المُضاد لكوفيد-19

ما الغرض الذي يستخدم من أجله هذا اللقاح؟

هذا اللقاح يوفر لك الحماية من فيروس كورونا (2-SARS-CoV). إذا أصبت بهذا الفيروس، فقد تعاني من أعراض. مثل الحمى والسعال و آلام في الحلق وسيلان الأنف وفقدان حاسة الشم والتذوق. ويمكن أيضًا أن تعاني من أعراض خطيرة. مثل ضيق في التنفس والالتهاب الرئوي. بعض الناس يموتون جراء الإصابة بفيروس كورونا.

يتم إعطاؤك هذا اللقاح لتجنب أن تمرض بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

كيف يعمل هذا اللقاح؟




إذا تعرضت لفيروس كورونا بعد الحصول على اللقاح، فسوف يتعرف جسمك على هذا الفيروس. لأن جسمك سوف يكون قد أنتج بالتأكد أجسامًا مضادة تحميك من هذا الفيروس. وذلك سوف يجنبك أن تمرض بسبب هذا الفيروس، وإذا أصبت بالمرض فسوف تكون الأعراض خفيفة.

تحتاج إلى الحصول على جرعتين من اللقاح لتتمتع بحماية جيدة ضد فيروس كورونا. بعد 7 أيام من الحصول على الجرعة الثانية سوف تصبح متمتعًا بالحماية ضد فيروس كورونا.

تُظهر الدراسات الأولية أن هذا اللقاح يقلل من خطر الإصابة بكوفيد-19 بنسبة 95%. وذلك يعني أنه من بين كل 100 شخص يُصابون بكوفيد-19 دون الحصول على اللقاح، سوف يُصاب 5 أشخاص فقط بكوفيد-19 بعد الحصول على اللقاح.

متى سأحصل على هذا اللقاح؟

يمكنك الحصول على هذا اللقاح إذا كان عمرك 12 عامًا أو أكثر. تحدد الحكومة الوطنية من سيتلقى الدعوة للحصول على هذا اللقاح.



سوف تحصل على هذا اللقاح مرتين. سوف تحصل على الجرعة الثانية من اللقاح بعد 3 أسابيع على الأقل من الحصول على الجرعة الأولى.



سوف يتم إعطاؤك حقنة اللقاح في أعلى ذراعك.

يمكنك الحصول على جرعة ثالثة في الحالات التالية:

- إذا كان جهازك المناعي يعمل بشكل سيئ للغاية. يوفر جهاز المناعة الحماية من الأمراض. سوف تحصل على هذه الجرعة الثالثة بعد 4 أسابيع على الأقل من الحصول على الجرعة الثانية. سوف تتلقى دعوة من طبيبك لهذا الغرض.

يمكنك الحصول على جرعة مُعززة في الحالات التالية:

- إذا كنت ضمن إحدى المجموعات المستهدفة التالية للحصول على جرعة مُعززة. تنصح الحكومة المركزية بالحصول على هذه الجرعة بعد 3 أشهر على الأقل من آخر جرعة حصلت عليها.

كيف تم اعتماد هذا اللقاح؟

- لقد تم إجراء الكثير من الدراسات حول سلامة وفعالية هذا اللقاح. وقد تم إجراء هذه الدراسات في وقت واحد، وليس بالتتابع. وقد وُفّر ذلك الكثير من الوقت.
- وتم تقييم نتائج هذه الدراسات بشكل مباشر.

لم يتم تخطي أي خطوات مهمة من خطوات التحقق من سلامة وفعالية اللقاح.

انتبه!



يمكنك القيادة بعد الحصول على هذا اللقاح. لا تقود السيارة إذا كنت تعاني من آثار جانبية مثل الشعور بالتعب.



هل أنتِ حامل؟ وفقًا للمعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM)، فإن اللقاح آمن للسيدات الحوامل.

التحذيرات الرئيسية

أسأل طبيبك عما إذا كان يمكنك تلقي هذا اللقاح إذا كنت:

- هل سبق أن عانيت من رد فعل تحسسي تجاه أحد اللقاحات.

ينصح المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) بتحديد موعد جديد في الحالات التالية:

- إذا كنت مريضًا جدًا أو تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة قبل الحصول على اللقاح.
- إذا كنت مُصابًا بكوفيد-19. أو إذا كان هناك احتمال بأنك مُصاب بكوفيد-19.
- إذا فاتك موعد الحصول على اللقاح.

احتمالية حدوث التهاب في عضلة القلب أو التهاب التامور ضئيلة للغاية. عندما يحدث ذلك، عادة ما يكون في غضون أسبوعين. يحدث ذلك عادة بعد الحصول على الجرعة الثانية وعادة لدى الشباب. لذا، اتصل بطبيبك على الفور إذا عانيت مما يلي بعد الحصول على اللقاح:

- ألم الصدر.
- عدم القدرة على التنفس بشكل جيد.
- خفقان القلب.

الآثار الجانبية الأساسية

كما هو الحال مع اللقاحات الأخرى، قد تظهر عليك بعض الآثار الجانبية بعد حقنك بجرعة اللقاح. وذلك لأن اللقاح يجعل دفاعات الجسم تعمل. وتعمل هذه الدفاعات على الحماية من فيروس كورونا.

وقد أظهرت الدراسات أن الآثار الجانبية التالية هي الأكثر شيوعًا:

- الشعور بألم في موضع الحقن (أكثر من 80%).
- الشعور بالتعب (أكثر من 60%).
- الصداع (أكثر من 50%).
- آلام العضلات (أكثر من 30%).
- الحمى (أكثر من 10%).
- الإسهال (أكثر من 10%).

عادة ما تستمر هذه الأعراض من يوم إلى ثلاثة أيام.

من الآثار الجانبية الخطيرة التي نادرًا ما تحدث التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور.

هل ترغب في معرفة المزيد من المعلومات

هل لديك أسئلة أو شكوك حول الحصول على اللقاح؟ تناقش مع طبيبك أو مع الصيدلي بشأن ذلك.

للاطلاع على النشرة الرسمية لهذا اللقاح، يُرجى زيارة

geneesmiddeleninformatiebank.nl.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة coravaccinatie.nl.

هل ترغب في الإبلاغ عن أثر جانبي أو معرفة المزيد عنه؟

هذا متاح من خلال lareb.nl.