

Samenvatting van diazepam

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Diazepam maakt u rustiger, minder angstig, ontspant uw spieren en zorgt voor minder ontwenningverschijnselen. Ook stopt het epilepsieaanvallen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- angst
- spanning
- onrust
- paniekstoornissen
- slecht slapen
- alcoholontwenning
- spierkrampen
- epilepsie

U wordt binnen 1 uur slaperig, rustig en uw spieren zijn minder gespannen. Het werkt 8 tot 12 uur lang.

Heeft u epilepsie? Dan krijgt u diazepam via een vloeistof (klysma) die u in uw anus (poepgat) spuit. De epilepsieaanval wordt binnen 5 tot 10 minuten minder. Het werkt 20 tot 30 minuten lang tegen epilepsie. Ook maakt diazepam u 12 tot 24 uur rustiger.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- suf, slaperig of moe worden
- minder snel reageren. Dit kan tot de volgende dag duren.
- slappe spieren
- problemen met geheugen
- minder goede coördinatie
- sneller vallen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Gebruik

Diazepam is er als tabletten en klysma's. Dit medicijn wordt soms ook als infuus of injectie gegeven. Deze tekst gaat alleen over de tabletten en klysma's.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met diazepam

Slik de tablet door met een half glas water.

Klysma met diazepam

Bij een epilepsieaanval zal een gezinslid, verzorger of arts de klysma inbrengen.

1. U wordt op uw zij gelegd met uw onderste been gestrekt en uw bovenste been opgetrokken.
2. De lange tuit zo ver mogelijk via uw anus (poepgat) naar binnen brengen.
3. Knijp de fles langzaam leeg.
4. Houdt de fles ingedrukt als u de tuit uit uw anus haalt. Dan loopt de vloeistof niet terug in de fles.
5. Blijf 5 tot 10 minuten liggen. Dan komt de vloeistof er niet meer uit.

Waarschuwingen

Let op! Gebruik diazepam niet te vaak tegen slecht slapen. Bijvoorbeeld niet vaker dan 1 keer in de 3 dagen.



Let op! Gebruikt u diazepam elke dag? Dan kan het moeilijk worden om hiermee te stoppen. Heeft u het langer dan 2 weken achter elkaar gebruikt tegen slecht slapen? Of langer dan 2 maanden achter elkaar bij angst en spanning? Stop dan niet zomaar. Bespreek het met uw arts of apotheker.



Let op!

- Gebruikt u diazepam **elke dag**? Dan mag u **niet autorijden**.
- Gebruikt u diazepam **af en toe**? Dan mag u **steeds 3 dagen niet autorijden** nadat u diazepam heeft gebruikt.

Samenvatting van **diazepam**



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby.



Let op! Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts of apotheker. Gebruik dit medicijn **niet** voor lange tijd als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

