

Medicijn in het kort voor **Doxycycline**

Capsules met vertraagde afgifte bij **rosacea**

Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij puistjes en rode bulten op het gezicht. Dit komt door de ziekte rosacea.

Hoe werkt dit medicijn?

Dit medicijn maakt ontstekingen op uw huid minder. **Na 4 tot 6 weken heeft u al minder klachten.** Het aantal rode bulten en puistjes in uw gezicht wordt uiteindelijk ongeveer de helft minder.

Belangrijkste waarschuwingen

Bacteriën kunnen resistent worden voor dit medicijn. Dit betekent dat bacteriën niet meer gevoelig zijn voor het medicijn. Het is belangrijk dat dit niet gebeurt. Gebruik dit medicijn daarom op de juiste manier. U mag dit medicijn alleen gebruiken als u het van uw arts heeft gekregen.



Dit medicijn heeft veel wisselwerkingen met andere medicijnen. Laat uw apotheker daarom controleren of u dit medicijn veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen. Ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.



Kom niet in fel zonlicht en ga niet onder de zonnebank als u dit medicijn gebruikt. U kunt last krijgen van jeuk, een rode huid en ernstige verbranding. Ook kunt u last krijgen van huiduitslag en verkleuring van uw huid.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiters hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.



Neem de capsule heel in met een heel glas water.

Zorg ervoor dat u **rechttop** zit of staat.

Neem de capsule het liefst **1 uur voor uw ontbijt**. Het wordt dan het beste in het lichaam opgenomen. Of neem de capsule 2 uur na uw ontbijt.

Eet of drink 1 uur voor u dit medicijn inneemt **geen melk, yoghurt of kaas**. Wacht nadat u dit medicijn heeft ingenomen 2 uur voordat u dit weer eet of drinkt. Dit medicijn werkt dan minder goed.



Bent u een capsule vergeten in te nemen? U neemt de capsule 1 keer per dag. Duurt het **meer dan 8 uur** tot u de volgende capsule moet innemen? Neem de capsule dan alsnog in. Duurt het **minder dan 8 uur** tot u de volgende capsule moet innemen? Sla de vergeten capsule dan over.

Let op!



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.



Bent u zwanger? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn kunt gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Geeft u borstvoeding? Dit medicijn kan in de moedermelk komen. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Misselijk zijn. Bent u misselijk? Neem de capsule dan in met wat eten.
- Jeuk, een branderig gevoel of rood worden van mond, keel, vagina of poepgat (anus). Heeft u hier last van? Neem dan contact op met uw arts.

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Diarree. Heeft u erge diarree? Of zit er bloed in uw diarree? Neem dan contact op met uw arts.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur en in het doosje. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Meer weten?

Kijk op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl) en [apotheek.nl](https://www.apotheek.nl) of vraag uw arts of apotheker.