

Medicijn in het kort voor **Doxycycline**

Tabletten bij **een ontsteking met bacteriën**

Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij een ontsteking van luchtwegen, huid, darmen en vagina of penis. En bij de ziekte van Lyme, malaria en Q-koorts.

Hoe werkt dit medicijn?

U heeft een ontsteking door een bacterie. Dit medicijn doodt bacteriën (antibioticum). U heeft meestal **binnen een paar dagen minder klachten**.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.



Neem de tablet in met een heel glas water. Zorg ervoor dat u **rechttop** zit of staat.



U kunt de tablet met en zonder eten innemen.

Neem de tablet niet in vlak voor u gaat slapen.



vergeten

Bent u dit medicijn vergeten?

U neemt de tablet 1 keer per dag. Duurt het **meer dan 8 uur** tot u de volgende tablet moet innemen? Neem de vergeten tablet dan direct in. Duurt het **minder dan 8 uur**? Sla de vergeten tablet dan over. U neemt deze tablet alsnog aan het einde van de kuur.

U neemt de tablet 2 keer per dag. Duurt het **meer dan 4 uur** tot u de volgende tablet moet innemen? Neem de vergeten tablet dan direct in. Duurt het **minder dan 4 uur**? Sla de vergeten tablet dan over. U neemt deze tablet alsnog aan het einde van de kuur.

Belangrijkste waarschuwingen



afmaken

Bacteriën kunnen resistent worden voor dit medicijn. Dit betekent dat bacteriën niet meer gevoelig zijn voor het medicijn. Het is belangrijk dat dit niet gebeurt. Gebruik dit medicijn daarom op de juiste manier en maak de kuur af. U mag dit medicijn alleen gebruiken als u het van uw arts heeft gekregen.



!

Kom niet in fel zonlicht en ga niet onder de zonnebank als u dit medicijn gebruikt. U kunt last krijgen van jeuk, een rode huid en ernstige verbranding. Ook kunt u last krijgen van huiduitslag en verkleuring van uw huid.



Zijn uw klachten na **3 dagen** niet minder of juist erger? Neem dan contact op met uw arts.

Let op!



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.



!

Bent u zwanger? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn kunt gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



!

Geeft u borstvoeding? Dit medicijn kan in de moedermelk komen. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Misselijk zijn. Bent u misselijk? Neem de tablet dan in met wat eten.
- Jeuk, een branderig gevoel of rood worden van mond, keel, vagina of poepgat (anus). Heeft u hier last van? Neem dan contact op met uw arts.

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Diarree. Heeft u erge diarree? Of zit er bloed in uw diarree? Neem dan contact op met uw arts.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur en in het doosje. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl en apotheek.nl of vraag uw arts of apotheker.