

Medicijn in het kort voor **Ethinylestradiol en levonorgestrel**

Tabletten (de pil) **endometriose (Seasonique)**

Waarvoor is dit medicijn?

U kunt dit medicijn gebruiken bij endometriose. Bij deze ziekte zit er slijmvlies van de baarmoeder op plekken waar het niet hoort. Zoals uw eierstokken, eileiders, buikvlies, blaas of darmen. U kunt hierdoor veel pijn hebben als u ongesteld bent.

Gebruik bij endometriose

Let op: Deze klacht of ziekte staat niet in de bijsluiter. Dit komt omdat het CBG en de fabrikant het medicijn niet hebben onderzocht bij endometriose. Maar artsen hebben wel ervaring met dit medicijn bij deze ziekte. Over het gebruik hebben artsen afspraken gemaakt. Daarom kan uw arts of apotheker u ook dit medicijn geven. Overleg tussen u en uw behandelend arts of apotheker is noodzakelijk.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.

Plak de weeksticker met de dag waarop u begint met de pil bovenaan de strip.

Slik **12 weken** de roze pil en daarna **1 week** de witte pil. Daarna begint u met een nieuwe verpakking.

Als u de witte pil slikt wordt u ongesteld.

Gaat u de pil voor het eerst gebruiken?

Begin dan op de eerste dag dat u ongesteld bent. U kunt dan niet zwanger worden.

Begint u niet op de eerste dag dat u ongesteld bent?

Maar een paar dagen later? De pil werkt dan pas na 7 dagen. Dit betekent dat u zwanger kunt worden. Gebruik daarom de eerste 7 dagen een condoom.



vergeten

Bent u dit medicijn vergeten? Duurt het **meer dan 12 uur** tot u de volgende pil moet innemen? Of bent u een witte pil vergeten? Neem de pil dan direct in. Duurt het **minder dan 12 uur**? Of bent u na de witte pil vergeten te starten met een nieuwe verpakking? Dan kunt u zwanger worden. Kijk in het schema in de bijsluiter of op apotheek.nl wat u dan moet doen.

Let op!



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.



Bent u zwanger? Stop met de pil als u erachter komt dat u zwanger bent. Heeft u de pil toch ingenomen? Dit is niet slecht voor uw baby.



Geeft u borstvoeding? Vanaf 6 weken na de bevalling kunt u de pil veilig gebruiken tijdens het geven van borstvoeding.

Belangrijkste waarschuwingen



Moet u **binnen 4 uur** na het innemen van de pil **overgeven**? Of heeft u **hele dunne diarree**? Neem direct een nieuwe pil in. Heeft u **langer dan 1 dag** last van **overgeven** of **hele dunne diarree**? Dan werkt de pil minder goed. Gebruik daarom een condoom tot 7 dagen nadat u weer beter bent.



Krijgt uw been een andere kleur of heeft u last van pijn in uw been, hoesten, snel ademen of pijn op uw borst? Dit kan erg gevaarlijk zijn. Bel direct uw huisarts of huisartsenpost.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Bloedverlies in de weken dat u niet ongesteld bent.
- Buikpijn, misselijk zijn, hoofdpijn of een verandering in hoe u zich voelt.
- Zwaarder worden.
- Pijnlijke borsten.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Meer weten?

Kijk op apotheek.nl of vraag uw arts of apotheker.