

# Medicijn in het kort voor **Ethinylestradiol en levonorgestrel** Tabletten (de pil) **om zwangerschap te voorkomen (Seasonique)**

## Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat u niet zwanger wordt.

## Hoe werkt dit medicijn?

In de pil zitten stoffen die ervoor zorgen dat er geen eitje vrijkomt uit uw eierstokken.

### De pil zorgt er zo voor dat u niet zwanger wordt als u seks heeft.

Als u de pil goed gebruikt is de kans dat u zwanger wordt kleiner dan 1%.

## Belangrijkste waarschuwingen



Moet u **binnen 4 uur** na het innemen van de pil **overgeven**? Of heeft u **hele dunne diarree**? Neem direct een nieuwe pil in. Heeft u **langer dan 1 dag** last van **overgeven** of **hele dunne diarree**? Dan werkt de pil minder goed. Gebruik daarom een condoom tot 7 dagen nadat u weer beter bent.



Krijgt uw been een andere kleur of heeft u last van pijn in uw been, hoesten, snel ademen of pijn op uw borst? Dit kan erg gevaarlijk zijn. Bel direct uw huisarts of huisartsenpost.

## Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.

Plak de weeksticker met de dag waarop u begint met de pil bovenaan de strip.

Slik **12 weken** de roze pil en daarna **1 week** de witte pil. Daarna begint u met een nieuwe verpakking.

Als u de witte pil slikt wordt u ongesteld.

### Gaat u de pil voor het eerst gebruiken?

Begin dan op de eerste dag dat u ongesteld bent. U kunt dan niet zwanger worden.

### Begint u niet op de eerste dag dat u ongesteld bent?

Maar een paar dagen later? De pil werkt dan pas na 7 dagen. Dit betekent dat u zwanger kunt worden. Gebruik daarom de eerste 7 dagen een condoom.



Bent u dit medicijn vergeten? Duurt het **meer dan 12 uur** tot u de volgende pil moet innemen? Of bent u een witte pil vergeten? Neem de pil dan direct in. Duurt het **minder dan 12 uur**? Of bent u na de witte pil vergeten te starten met een nieuwe verpakking? Dan kunt u zwanger worden. Kijk in het schema in de bijsluiter of op [apotheek.nl](http://apotheek.nl) wat u dan moet doen.

## Let op!



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.



Bent u zwanger? Stop met de pil als u erachter komt dat u zwanger bent. Heeft u de pil toch ingenomen? Dit is niet slecht voor uw baby.



Geeft u borstvoeding? Vanaf 6 weken na de bevalling kunt u de pil veilig gebruiken tijdens het geven van borstvoeding.

## Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Bloedverlies in de weken dat u niet ongesteld bent.
- Buikpijn, misselijk zijn, hoofdpijn of een verandering in hoe u zich voelt.
- Zwaarder worden.
- Pijnlijke borsten.

## Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

## Meer weten?

Kijk op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](http://geneesmiddeleninformatiebank.nl) en [apotheek.nl](http://apotheek.nl) of vraag uw arts of apotheker.