

Medicijn in het kort voor **Fluoxetine**

Capsules bij **erge angst**

Waarvoor is dit medicijn?

U kunt dit medicijn gebruiken bij erge angst, zoals paniek, sociale angst en posttraumatische stressstoornis. Dit is angst na een hele nare ervaring in uw leven. Zoals een oorlog, overval, ongeluk of seksueel geweld.

Gebruik bij erge angst

Let op: Deze klacht of ziekte staat niet in de bijsluiter. Dit komt omdat het CBG en de fabrikant het medicijn niet hebben onderzocht bij erge angst. Maar artsen hebben wel ervaring met dit medicijn bij deze ziekte. Over het gebruik hebben artsen afspraken gemaakt. Daarom kan uw arts of apotheker u ook dit medicijn geven. Overleg tussen u en uw behandelend arts of apotheker is noodzakelijk.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.



Neem de capsule in met een half glas water.
Niet kauwen.

Het maakt niet uit hoe laat u dit medicijn inneemt. Wordt u erg suf door dit medicijn? Neem het dan 's avonds in voordat u naar bed gaat. Heeft u veel last van onrust en kunt u er slecht van slapen? Neem het dan 's ochtends in.



vergeten

Bent u de capsule vergeten in te nemen? U neemt dit medicijn 1 keer per dag. Duurt het **meer dan 8 uur** tot u de volgende capsule moet innemen? Neem de vergeten capsule dan direct in. Duurt het **minder dan 8 uur** tot u de volgende capsule moet innemen? Sla de vergeten capsule dan over.

Let op!



U kunt de eerste tijd suf zijn. Rijd dan geen auto.

Gebruikt u **elke dag 20 mg of minder**? En heeft u geen last van bijwerkingen? Dan mag u autorijden.

Gebruikt u **elke dag meer dan 20 mg**? En heeft u geen last van bijwerkingen? Vraag aan uw arts of u mag autorijden.



Wees voorzichtig met alcohol drinken. Dit kan u nog suffer maken.



Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Maagklachten of darmklachten, zoals misselijk zijn of diarree, hoofdpijn en niet kunnen slapen. Ook kunt u zich moe voelen. Meestal worden deze bijwerkingen na 1 week minder.
- Seksuele problemen, zoals geen stijve penis kunnen krijgen of minder zin hebben in seks.

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Hartkloppingen.
- Sneller blauwe plekken krijgen, bloeden of bloed uit de vagina.



Denken aan jezelf pijn willen doen of zelfmoord. Neem dan contact op met uw arts of bel 0800-0113.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Meer weten?

Kijk op apotheek.nl of vraag uw arts of apotheker.