

# Medicijn in het kort voor **Fluoxetine**

## Capsules bij **depressie**

### Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij depressie.

### Hoe werkt dit medicijn?

Als u depressief bent heeft u minder serotonine in uw hersenen. Serotonine is een stof in uw hersenen en is belangrijk voor hoe u zich voelt.

Dit medicijn zorgt voor meer serotonine in uw hersenen. Hierdoor **voelt u zich minder somber**. U merkt na 4 tot 6 weken of dit medicijn goed werkt. Als u begint met dit medicijn kunnen de depressieve klachten in de eerste week erger worden.

### Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.



Neem de capsule in met een half glas water. **Niet kauwen.**

Het maakt niet uit hoe laat u dit medicijn inneemt. Wordt u erg suf door dit medicijn? Neem het dan 's avonds in voordat u naar bed gaat. Heeft u veel last van onrust en kunt u er slecht van slapen? Neem het dan 's ochtends in.



vergeten

Bent u de capsule vergeten in te nemen? U neemt dit medicijn 1 keer per dag. Duurt het **meer dan 8 uur** tot u de volgende capsule moet innemen? Neem de vergeten capsule dan direct in. Duurt het **minder dan 8 uur** tot u de volgende capsule moet innemen? Sla de vergeten capsule dan over.

### Let op!



U kunt de eerste tijd suf zijn. Rijd dan geen auto.

Gebruikt u **elke dag 20 mg of minder**? En heeft u geen last van bijwerkingen? Dan mag u autorijden.

Gebruikt u **elke dag meer dan 20 mg**? En heeft u geen last van bijwerkingen? Vraag aan uw arts of u mag autorijden.



Wees voorzichtig met alcohol drinken. Dit kan u nog suffer maken.



Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

### Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Maagklachten of darmklachten, zoals misselijk zijn of diarree, hoofdpijn en niet kunnen slapen. Ook kunt u zich moe voelen. Meestal worden deze bijwerkingen na 1 week minder.
- Seksuele problemen, zoals geen stijve penis kunnen krijgen of minder zin hebben in seks.

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Hartkloppingen.
- Sneller blauwe plekken krijgen, bloeden of bloed uit de vagina.



Denken aan jezelf pijn willen doen of zelfmoord. Neem dan contact op met uw arts of bel 0800-0113.

### Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

### Meer weten?

Kijk op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](http://geneesmiddeleninformatiebank.nl) en [apotheek.nl](http://apotheek.nl) of vraag uw arts of apotheker.