

Medicijn in het kort voor **Fluoxetine**

Oplosbare tabletten bij **premenstrueel syndroom (PMS)**

Waarvoor is dit medicijn?

U kunt dit medicijn gebruiken bij klachten die horen bij premenstrueel syndroom (PMS). Zoals gevoelig reageren, pijn in uw borsten, een opgeblazen buik en somber zijn. U heeft hier last van in de week voordat u ongesteld wordt. De klachten gaan weg als u ongesteld bent.

Gebruik bij premenstrueel syndroom (PMS)

Let op: Deze klacht of ziekte staat niet in de bijsluiter. Dit komt omdat het CBG en de fabrikant het medicijn niet hebben onderzocht bij premenstrueel syndroom (PMS). Maar artsen hebben wel ervaring met dit medicijn bij deze ziekte. Over het gebruik hebben artsen afspraken gemaakt. Daarom kan uw arts of apotheker u ook dit medicijn geven. Overleg tussen u en uw behandelend arts of apotheker is noodzakelijk.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.



Laat de tablet uit elkaar vallen in water. Roer en drink op. Spoel het glas daarna met water en drink dat ook op.

Het maakt niet uit hoe laat u dit medicijn inneemt. Wordt u erg suf door dit medicijn? Neem het dan 's avonds in voordat u naar bed gaat. Heeft u veel last van onrust en kunt u er slecht van slapen? Neem het dan 's ochtends in.



Bent u de tablet vergeten in te nemen? U neemt dit medicijn 1 keer per dag. Duurt het **meer dan 8 uur** tot u de volgende tablet moet innemen? Neem de vergeten tablet dan direct in. Duurt het **minder dan 8 uur** tot u de volgende tablet moet innemen? Sla de vergeten tablet dan over.

Let op!



U kunt de eerste tijd suf zijn. Rijd dan geen auto.

Gebruikt u **elke dag 20 mg of minder**? En heeft u geen last van bijwerkingen? Dan mag u autorijden.

Gebruikt u **elke dag meer dan 20 mg**? En heeft u geen last van bijwerkingen? Vraag aan uw arts of u mag autorijden.



Wees voorzichtig met alcohol drinken. Dit kan u nog suffer maken.



Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Maagklachten of darmklachten, zoals misselijk zijn of diarree, hoofdpijn en niet kunnen slapen. Ook kunt u zich moe voelen. Meestal worden deze bijwerkingen na 1 week minder.
- Seksuele problemen, zoals geen stijve penis kunnen krijgen of minder zin hebben in seks.

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Hartkloppingen.
- Sneller blauwe plekken krijgen, bloeden of bloed uit de vagina.



Denken aan jezelf pijn willen doen of zelfmoord. Neem dan contact op met uw arts of bel 0800-0113.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Meer weten?

Kijk op apotheek.nl of vraag uw arts of apotheker.