

# Medicijn in het kort voor **Fusidinezuur**

## Crème bij **een eikelontsteking**

### Waarvoor is dit medicijn?

U kunt dit medicijn gebruiken bij ontsteking van uw eikel door een bacterie. U merkt dit aan rode of witte plekken, schilfers of puistjes op uw eikel. Het kan jeuken en branden. Soms is ook de binnenkant van de voorhuid ontstoken.

#### Gebruik bij eikelontsteking

Let op: Deze klacht of ziekte staat niet in de bijsluiters. Dit komt omdat het CBG en de fabrikant het medicijn niet hebben onderzocht bij eikelontsteking. Maar artsen hebben wel ervaring met dit medicijn bij deze ziekte. Over het gebruik hebben artsen afspraken gemaakt. Daarom kan uw arts of apotheker u ook dit medicijn geven. Overleg tussen u en uw behandelend arts of apotheker is noodzakelijk.

### Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiters hoeveel u moet gebruiken. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.

Spoel eerst uw eikel en voorhuid schoon met water en maak droog.

Gebruik dit medicijn goed verdeeld over de dag. Het werkt dan beter.

Smeer dit medicijn in een dunne laag op uw eikel en voorhuid.

Was uw handen.

Trek daarna schoon ondergoed aan.



vergeten

Bent u vergeten om te smeren? Het is niet erg als u dit medicijn 1 keer vergeet. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla het dan over.

### Let op!



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

### Belangrijkste waarschuwingen

Zorg dat dit medicijn niet in uw ogen, mond of neus komt. Hierdoor gaan deze plekken veel irriteren. Gebeurt dit toch? Spoel dan direct goed met water.



afmaken

Bacteriën kunnen resistent worden voor dit medicijn. Dit betekent dat bacteriën niet meer gevoelig zijn voor het medicijn. Het is belangrijk dat dit niet gebeurt. Gebruik dit medicijn daarom op de juiste manier en maak de kuur af.

Dit medicijn kan het rubber van condooms kapot maken. Een condoom kan daardoor makkelijker scheuren.

### Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Jeuk, rode huid of huiduitslag, vooral in huidplooiën en op andere gevoelige plekken.

### Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

### Meer weten?

Kijk op [apotheek.nl](https://www.apotheek.nl) of vraag uw arts of apotheker.