

# Medicijn in het kort voor **Fusidinezuur**

## Ooggel bij **een ontsteking van de oogleden**

### Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij een ontsteking van de oogleden.

### Hoe werkt dit medicijn?

U heeft een ontsteking door een bacterie. Dit medicijn doodt bacteriën (antibioticum).

**U heeft meestal na een paar dagen minder klachten.**

### Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet gebruiken. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.

Gebruik dit medicijn goed verdeeld over de dag. Het werkt dan beter.

Was uw handen voor en na het aanbrengen van dit medicijn met water en zeep. Droog ze goed af.

Heeft u schilfers of korsten op uw oogleden? Haal deze dan weg met een watje en water.

Doe wat ooggel op een wattenstaafje. Wrijf met het wattenstaafje de ooggel op uw ooglid



vergeten

Bent u de ooggel vergeten te gebruiken?

**Gebruikt u de ooggel 2 keer per dag?**

Duurt het **meer dan 4 uur** tot u de volgende ooggel moet gebruiken? Gebruik de vergeten ooggel dan direct. Duurt het **minder dan 4 uur** tot u de ooggel moet gebruiken? Sla de vergeten ooggel dan over.

**Gebruikt u de ooggel 4 keer per dag?**

Duurt het **meer dan 2 uur** tot u de volgende ooggel moet gebruiken? Gebruik de vergeten ooggel dan direct. Duurt het **minder dan 2 uur** tot u de ooggel moet gebruiken? Sla de vergeten ooggel dan over.

### Let op!



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.



Bent u zwanger? U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u zwanger bent.



Geeft u borstvoeding? U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft.

### Belangrijkste waarschuwingen

Raak de ontstoken plekken zo weinig mogelijk aan. Zo voorkomt u dat u anderen besmet met de bacterie.



Bacteriën kunnen resistent worden voor dit medicijn. Dit betekent dat bacteriën niet meer gevoelig zijn voor het medicijn. Het is belangrijk dat dit niet gebeurt. Gebruik dit medicijn daarom op de juiste manier en maak de kuur af.



Zijn uw klachten na **3 dagen** niet minder of juist erger? Neem dan contact op met uw arts.

### Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Jeuk.
- Een prikkend of branderig gevoel van de ogen na gebruik.
- Wazig zien na gebruik. Dit verdwijnt vanzelf.

### Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

### Meer weten?

Kijk op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](http://geneesmiddeleninformatiebank.nl) en [apotheek.nl](http://apotheek.nl) of vraag uw arts of apotheker.