

# Medicijn in het kort voor **Fusidinezuur**

## Ooggel bij **een ontsteking van het oog**

### Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij een ontsteking van het oog.

### Hoe werkt dit medicijn?

U heeft een ontsteking door een bacterie. Dit medicijn doodt bacteriën (antibioticum). **U heeft meestal na een paar dagen minder klachten.**

### Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet gebruiken. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.

Gebruik dit medicijn goed verdeeld over de dag. Het werkt dan beter.

Was uw handen voor en na het aanbrengen van dit medicijn met water en zeep. Droog ze goed af.

Heeft u schilfers of korsten op uw oogleden? Haal deze dan weg met een watje en water.

Draagt u lenzen? Haal deze uit uw oog voordat u dit medicijn gebruikt. U mag geen lenzen dragen als u dit medicijn gebruikt.

Draai het dopje van de tube. Neem de tube in uw hand alsof u een pen vasthoudt.

Trek met uw andere hand uw onderste ooglid omlaag. Er ontstaat een gootje. Buig uw hoofd naar achteren en kijk omhoog. Knijp zachtjes in de tube en laat één druppel in het gootje vallen.

Buig uw hoofd terug en doe uw oog dicht. Duw zachtjes uw vinger in uw binnenste ooghoek tussen uw oog en uw neus (traankanaal). Het medicijn blijft zo in uw oog. Gebruikt u dit medicijn voor een ontstoken traankanaal? Druk uw traankanaal dan niet dicht.



vergeten

Bent u dit medicijn vergeten?

#### Gebruikt u de ooggel **2 keer per dag?**

Duurt het **meer dan 4 uur** tot u de ooggel weer moet gebruiken? Gebruik de ooggel dan direct.

Duurt het **minder dan 4 uur?** Sla de ooggel dan over.

#### Gebruikt u de ooggel **4 keer per dag?**

Duurt het **meer dan 2 uur** tot u de ooggel weer moet gebruiken? Gebruik de ooggel dan direct.

Duurt het **minder dan 2 uur?** Sla de ooggel dan over.

### Let op!



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.



Bent u zwanger? U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u zwanger bent.



Geeft u borstvoeding? U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft.

### Belangrijkste waarschuwingen

Raak de ontstoken plekken zo weinig mogelijk aan. Zo voorkomt u dat u anderen besmet met de bacterie.



afmaken

Bacteriën kunnen resistent worden voor dit medicijn. Dit betekent dat bacteriën niet meer gevoelig zijn voor het medicijn. Het is belangrijk dat dit niet gebeurt. Gebruik dit medicijn daarom op de juiste manier en maak de kuur af.



Zijn uw klachten na **3 dagen** niet minder of juist erger? Neem dan contact op met uw arts.

### Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

### Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Jeuk.
- Een prikkend of branderig gevoel van de ogen na gebruik.
- Wazig zien na gebruik. Dit verdwijnt vanzelf.

### Meer weten?

Kijk op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](http://geneesmiddeleninformatiebank.nl) en [apotheek.nl](http://apotheek.nl) of vraag uw arts of apotheker.