

Samenvatting van lorazepam

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Lorazepam maakt u rustiger, minder angstig, ontspant uw spieren. Ook zorgt het voor minder ontwenningsverschijnselen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- angst
- spanning
- onrust
- paniekstoornissen
- slecht slapen
- alcoholontwenning
- misselijk zijn door chemokuren
- om rustig te worden voor een operatie

U wordt binnen 1 uur slaperig, rustig en uw spieren zijn minder gespannen. Dit medicijn werkt 8 tot 12 uur lang.

Gebruik

Lorazepam is er als tabletten en drank. Dit medicijn wordt ook in het ziekenhuis gegeven als injecties. Deze tekst gaat alleen over de tabletten en drank.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Tabletten met lorazepam

Neem de tablet in met een vol glas water.

Drank met lorazepam

1. Schud de fles goed.
2. Meet de juiste hoeveelheid af met een maatbeker, doseerlepel of doseerspuit.
3. Drink deze hoeveelheid op.

Let op! Gebruik lorazepam niet te vaak bij slecht slapen. Bijvoorbeeld niet vaker dan 1 keer in de 3 dagen.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- suf, slaperig of moe worden
- minder snel reageren
- Dit kan tot de volgende dag duren.
- slappe spieren
- problemen met het geheugen
- sneller vallen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Gebruikt u lorazepam elke dag? Dan kan het moeilijk zijn om hiermee te stoppen. Heeft u het langer dan 2 weken achter elkaar gebruikt bij slecht slapen? Of langer dan 2 maanden achter elkaar bij angst en spanning? Stop dan niet zomaar. Bouw langzaam af in overleg met uw apotheker of arts.



Let op!

- Gebruikt u lorazepam **elke dag**? Dan mag u **niet autorijden**.
- Gebruikt u lorazepam **af en toe**? Dan mag u steeds **3 dagen niet autorijden** nadat u heeft gebruikt.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby.



Let op! Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts of apotheker. Gebruik dit medicijn niet voor lange tijd als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

