

Samenvatting van **mebeverine**

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Mebeverine werkt tegen darmkrampen. Uw arts schrijft dit medicijn voor bij het prikkelbaredarmsyndroom (darmkrampen).

Mebeverine werkt binnen een paar uur.

Gebruik

Mebeverine is er als capsules

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de capsule heel door met een half glas water. Niet kauwen.

Heeft u moeite met slikken? U mag de capsule ook open maken en de korrels doorslikken. Kauw niet op de korrels.

U gebruikt de capsules 2 keer op een dag, 's ochtends en 's avonds.

Wordt uw stoelgang plotseling anders? Verliest u bloed of slijm bij de ontlasting? Of valt u ineens veel af? Waarschuw dan direct uw arts.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Overgevoeligheid. U kan dan huiduitslag, galbulten of jeuk krijgen.
- Hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Let op! Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

