

Samenvatting van metformine

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Metformine maakt uw bloedsuiker lager. Bij diabetes zit er te veel suiker in het bloed. Dit is schadelijk voor uw hart en bloedvaten, zenuwen, ogen en nieren.

Als u minder vruchtbaar bent, zorgt dit medicijn ervoor dat de kans groter is dat een eikel uit uw eierstok vrijkomt.

Uw arts schrijft dit medicijn voor:

- bij diabetes mellitus (suikerziekte)
- als u minder vruchtbaar bent geworden door teveel blaasjes (cysten) in uw eierstokken (PCOS)

Bij diabetes zorgt dit medicijn ervoor dat u meestal binnen een paar dagen minder last heeft van dorst, vaak plassen en een droge mond.

Binnen een paar weken bent u minder moe.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- Diarree
- Misselijk voelen en overgeven.
Wordt u misselijk? Neem dit medicijn dan bij het eten. Dan heeft u er minder last van.
- Minder zin om te eten
- Vreemde smaak in uw mond, vooral in het begin van de behandeling

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:



Gebruik

Metformine is er als tabletten en tabletten met een vertraagde afgifte.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Slik de tabletten met een half glas water.

Gebruikt u de tablet 1 keer per dag?

Neem deze dan **voor u gaat slapen**. Dan werkt het beter.

Let op! De tabletten met **verlengde afgifte** moet u **héél doorslikken**.

Hier komt de werkzame stof langzaam uit vrij. U mag deze tabletten **niet fijnmaken of erop kauwen**. Anders komt de dosis in één keer vrij.

Slik dit medicijn **elke dag**.

Dan heeft u minder kans op schade door suikerziekte, zoals:

- wonden die slecht genezen
- zenuwpijn
- problemen aan de nieren
- hart- en vaatziekten
- blind worden

Waarschuwingen



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.