

Samenvatting van metoclopramide

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Metoclopramide zorgt ervoor dat u minder misselijk bent.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij misselijk zijn en overgeven of om dit te voorkomen. Bijvoorbeeld:

- bij behandeling van kanker
- bij migraine
- tijdens de zwangerschap

Uw klachten worden meestal na 1 uur minder.

Gebruik

Metoclopramide is er als tabletten, drank en zetpil. Dit medicijn is er ook als injectie en infuus. Deze tekst gaat alleen over de tabletten, drank en zetpil.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Kies vaste tijdstippen waarop u dit medicijn inneemt. Dan vergeet u het minder snel.

Tabletten met metoclopramide

Slik de tabletten met een half glas water.

Drank met metoclopramide

1. Schud het flesje goed.
2. Meet de goede hoeveelheid af met een doseerpipet.
3. Slik deze hoeveelheid door.
4. Spoel het doseerpipet na met water. Bewaar het doseerpipet niet in de fles.

Zetpil met metoclopramide

1. Breng de zetpil in uw anus (poepgat), met de punt naar voren.
2. Als de zetpil moeilijk in uw poepgat gaat, maak het dan een beetje nat met water.
3. Breng de zetpil het liefst in nadat u heeft gepoept. Anders verliest u de zetpil te snel.

Let op! Heeft u migraine?

Neem dit medicijn dan bij **de eerste klachten** van een migraineaanval. Neem het **samen met een pijnstiller**. Bent u al **misselijk**? Neem dan een **zetpil** in plaats van een tablet. Neem 15 tot 30 minuten daarna een pijnstiller in.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- slaperig zijn
- zwak voelen
- problemen met bewegen. Dit komt zeer zelden voor als u dit medicijn te lang gebruikt. Gebruik het daarom **niet langer dan 5 dagen**.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Gebruikt u dit medicijn **elke dag**? Dan mag u de **eerste paar dagen** dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Gebruikt u dit medicijn **af en toe**? Dan mag u steeds **24 uur** niet autorijden nadat u dit medicijn heeft gebruikt.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken



Let op! Bent u zwanger? U mag dit medicijn **niet gebruiken vlak voor de bevalling**. Tijdens de rest van de zwangerschap is het wel veilig. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

