

Samenvatting van metronidazol op de huid

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Metronidazol werkt tegen bacteriën en amoeben (hele kleine parasieten).

Uw arts schrijft metronidazol op de huid voor bij:

- Rosacea. U heeft dan felrode plekken, bultjes en puistjes in uw gezicht.
- Een huidinfectie met stinkende wonden.
- Ontsteking van de eikel bij mannen.

Bij rosacea worden de klachten minder na een paar weken. Bij een huidinfectie met stinkende wonden ruikt de wond na een paar uur minder.

Bij een ontsteking van de eikel verdwijnen uw klachten na 2 tot 3 weken.

Gebruik

Metronidazol op de huid is er als crème en gel. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Metronidazol op de huid bij rosacea

1. Was de huid met lauw water en dep voorzichtig droog.
2. Smeer een dun laagje op de huid.
3. Was uw handen.

Metronidazol op de huid bij stinkende wonden

1. Spoel de wond schoon met 'fysiologische zoutoplossing'. Vraag dit aan uw apotheker. U kunt ook vers water uit de kraan gebruiken.
2. Smeer de gel met metronidazol daarna op uw wond.
3. Dek daarna uw wond af met steriel verband.
4. Was uw handen.

Metronidazol op de huid bij een eikelontsteking

1. Spoel uw eikel en voorhuid af met water.
2. Droog uw eikel daarna goed af, door te deppen.
3. Smeer daarna de crème in een dun laagje op uw eikel en voorhuid.
4. Was uw handen.

Let op! De crème of gel mag **niet in uw ogen, neus en mond komen**. Gebeurt dit toch? Spoel uw ogen, neus en mond meteen goed met veel water.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van irritatie van de huid. Zoals huiduitslag, jeuk en een brandend gevoel. Dit verdwijnt vanzelf.

Blijft u last houden van een geïrriteerde rode huid? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Gebruikt u metronidazol op de huid bij stinkende wonden of een eikelontsteking? Maak de hele kuur af. Ook als u geen klachten meer heeft, want misschien zijn er nog bacteriën. Bij rosacea kunt u wel op elk moment stoppen.



Let op! Kom **niet in de zon** met de huid waar dit medicijn op zit. Ga ook **niet onder de zonnebank**. Het UV-licht van de zon en de zonnebank zorgt er namelijk voor dat dit medicijn minder goed werkt.

Let op! Gebruikt u dit medicijn voor **eikelontsteking**? Dit medicijn maakt het rubber van condooms kapot. Gebruik een ander voorbehoedsmiddel.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft. Het kan wel de moedermelk een **nare metaalsmaak** geven. Voordat u begint met dit medicijn kunt u moedermelk afkolven en invriezen in een flesje.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

