

Medicijn in het kort voor **Miconazol**

Crème bij **eikelontsteking**

Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij een ontsteking van uw eikel door een schimmel. U kunt last hebben van rode of witte plekken, schilfers of puistjes op uw eikel. Het kan jeuken en branden.

Gebruik bij eikelontsteking

Let op! Deze klacht of ziekte staat niet in de bijsluiters. Dit komt omdat het CBG en de fabrikant het medicijn niet hebben onderzocht bij eikelontsteking. Maar artsen hebben wel ervaring met dit medicijn bij deze ziekte. Over het gebruik hebben artsen afspraken gemaakt. Daarom kan uw arts of apotheker u ook dit medicijn geven. Overleg tussen u en uw behandelend arts of apotheker is noodzakelijk.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiters hoeveel u moet gebruiken. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.

Spoel eerst uw eikel en voorhuid schoon met water en maak droog.



U gebruikt dit medicijn **1 of 2 keer per dag**. Kies daarvoor vaste tijdstippen, dan vergeet u het minder snel te gebruiken. Bijvoorbeeld 's ochtends en 's avonds.

Smeer de crème in een dunne laag op uw eikel en voorhuid.

Was uw handen.

Trek daarna schoon ondergoed aan.



Bent u vergeten om de crème te smeren? Het is niet erg als u de crème 1 keer vergeet. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla het dan over.

Hoe lang gebruikt u dit medicijn?

U gebruikt dit medicijn meestal 2 tot 6 weken.

Is uw huid genezen?
Blijf dit medicijn nog 1 week smeren. Anders kan de schimmel terugkomen.

Let op!



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Een rode of droge huid, jeuk of een warm gevoel van de huid. Dit gaat vanzelf over.

Belangrijkste waarschuwingen

Gebruik dit medicijn niet als u de bloedverdunders fenprocoumon of acenocoumarol gebruikt. Overleg met uw arts of apotheker.

De crème kan het rubber van condooms kapot maken. Een condoom kan daardoor makkelijker scheuren.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Meer weten?

Kijk op apotheek.nl of vraag uw arts of apotheker.