

Medicijn in het kort voor **Miconazol**

Gel voor in de mond voor **een ontsteking in uw mond (spruw), keel of slokdarm**

Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij een erge schimmelinfectie in de mond (spruw), keel en slokdarm.

U kunt last hebben van witte plekjes in de mond.

Hoe werkt dit medicijn?

Dit medicijn doodt schimmels.

U heeft meestal na 1 tot 4 weken geen klachten meer.

Belangrijkste waarschuwingen



Maak de hele kuur af. Ook als u denkt dat u beter bent. Er kunnen nog schimmels of gisten zijn. Zijn uw klachten al voor het einde van de kuur weg? Ga dan in ieder geval 1 week door met het gebruik als uw klachten weg zijn.

Gebruik dit medicijn niet als u de bloedverduuners fenprocoumon of acenocoumarol gebruikt. Overleg met uw arts of apotheker.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiters hoeveel u moet gebruiken. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.

Gebruik een maatlepel om de goede hoeveelheid te bepalen.

Verdeel de gel over beide kanten van de mond. Houd de gel een paar minuten in uw mond. Slik daarna door.

Wacht enige tijd na het innemen voordat u eet, drinkt, uw mond spoelt of uw tanden poetst. Anders werkt de gel niet goed.

Heeft u een kunstgebit? Haal het kunstgebit uit uw mond voordat u de gel inneemt. En poets het kunstgebit ook met de gel. Laat uw kunstgebit 's nachts uit.

Neem dit medicijn goed verdeeld over de dag in. Het werkt dan beter. U kunt dit medicijn het beste na het eten innemen en voor u gaat slapen.



Bent u de gel vergeten in te nemen? U gebruikt dit medicijn 4 keer per dag. Duurt het **meer dan 2 uur** tot u de volgende gel moet innemen? Neem de vergeten gel dan direct in. Duurt het **minder dan 2 uur** tot u de volgende gel moet innemen? Sla de vergeten gel dan over.

Let op!



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.



Bent u zwanger? U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u zwanger bent.



Geeft u borstvoeding? U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Misselijk zijn en overgeven. Deze klachten verdwijnen vanzelf.
- Een droge mond of een vreemd gevoel in de mond.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl en apotheek.nl of vraag uw arts of apotheker.