

Samenvatting van miconazol voor in de mond

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Miconazol doodt schimmels en gisten.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij infecties in de mond, keel (spruw) en slokdarm door schimmels en gisten.

Gebruik

Miconazol voor in de mond is er als gel.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Neem dit medicijn **na het eten**. Het werkt dan beter.

1. Meet de goede hoeveelheid af met een maatlepel.
2. Houd de gel een paar minuten in uw mond. Slik het daarna door.
3. Spoel uw mond niet na!

Een kuur met dit medicijn duurt **meestal 1 tot 4 weken**.

Zijn uw klachten al vóór het einde van de kuur weg? Ga daarna nog **minimaal 1 week door** met het gebruik van miconazol.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- misselijk zijn
- overgeven
- droge mond
- vreemd gevoel in de mond

Deze bijwerkingen verdwijnen vanzelf.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

Waarschuwingen



Let op! Gebruikt u de antistollingsmiddelen fenprocoumon of acenocoumarol? Dan mag u miconazol niet gebruiken. Uw apotheker controleert voor u dat u deze combinatie niet krijgt.



U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.



U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.



U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

