

# Medicijn in het kort voor **Morfine**

## Drank bij **kortademigheid**

### Waarvoor is dit medicijn?

U kunt dit medicijn gebruiken als u erg moeite heeft met ademen doordat het hart het bloed minder goed rond pompt (hartfalen).

### Gebruik bij kortademigheid

Let op! Deze klacht of ziekte staat niet in de bijsluiter. Dit komt omdat het CBG en de fabrikant het medicijn niet hebben onderzocht bij kortademigheid. Maar artsen hebben wel ervaring met dit medicijn bij deze ziekte. Over het gebruik hebben artsen afspraken gemaakt. Daarom kan uw arts of apotheker u ook dit medicijn geven. Overleg tussen u en uw behandelend arts of apotheker is noodzakelijk.

### Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.



Heeft u een **maatbeker** gekregen? Gebruik de maatbeker om de goede hoeveelheid te bepalen. Drink de maatbeker leeg. Drink daarna een glas water.

Heeft u een **doseerpipet** gekregen? Gebruik de doseerpipet om de goede hoeveelheid te bepalen. Doe de drank in een glas water of vruchtensap. Roer en drink op.

Heeft u een **druppelflacon** gekregen? Druppel het goede aantal druppels in een glas water of vruchtensap. Roer en drink op.



vergeten

Bent u de drank vergeten in te nemen? Neem de vergeten drank direct in.

**Wacht in ieder geval 4 uur** tot u de volgende drank inneemt.

### Let op!



Rijd geen auto als u dit medicijn gebruikt.



Wees voorzichtig met alcohol drinken. Dit kan u nog suffer maken.



Bent u zwanger? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn kunt gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.

### Belangrijkste waarschuwingen

Gebruikt u dit medicijn al voor een lange tijd en wilt u **stoppen**? Stop dan niet in één keer. U kunt last krijgen van klachten zoals: onrust, overgeven, zweten, trillen en niet kunnen slapen. Ga naar uw arts of apotheker als u wilt stoppen met dit medicijn.

### Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Verstopping. Drink veel water. Eet veel vezels, zoals groente, fruit en volkorenproducten. U kunt ook een laxeermiddel gebruiken.
- Misselijk zijn, buikpijn en overgeven. Dit gaat meestal over als uw lichaam gewend is aan dit medicijn.
- Suf en slaperig zijn.

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- In de war zijn.
- Huiduitslag, jeuk, droge mond.

### Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur en in de verpakking. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

### Meer weten?

Kijk op [apotheek.nl](http://apotheek.nl) of vraag uw arts of apotheker.