

Medicijn in het kort voor **Morfine**

Drank bij **pijn**

Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt bij erge pijn. Zoals na operaties, ongelukken, een hartaanval en bij kanker.

Hoe werkt dit medicijn?

Dit medicijn is een sterke pijnstillert. **Het maakt uw pijn minder.** U heeft meestal binnen 1 tot 2 uur minder pijn. Dit medicijn werkt 4 tot 7 uur lang.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter hoeveel u moet innemen. Gebruik dit medicijn altijd zoals uw arts of apotheker u vertelt.



Heeft u een **maatbeker** gekregen? Gebruik de maatbeker om de goede hoeveelheid te bepalen. Drink de maatbeker leeg. Drink daarna een glas water.

Heeft u een **doseerpipet** gekregen? Gebruik de doseerpipet om de goede hoeveelheid te bepalen. Doe de drank in een glas water of vruchtensap. Roer en drink op.

Heeft u een **druppelflacon** gekregen? Druppel het goede aantal druppels in een glas water of vruchtensap. Roer en drink op.



vergeten

Bent u de drank vergeten in te nemen? Neem de vergeten drank direct in. **Wacht in ieder geval 4 uur** tot u de volgende drank inneemt.

Let op!



Rijd geen auto als u dit medicijn gebruikt.



Wees voorzichtig met alcohol drinken. Dit kan u nog suffer maken.



Bent u zwanger? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn kunt gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.



Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat is slecht voor de baby.

Belangrijkste waarschuwingen

Gebruikt u dit medicijn al voor een lange tijd en wilt u **stoppen**? Stop dan niet in één keer. U kunt last krijgen van klachten zoals: onrust, overgeven, zweten, trillen en niet kunnen slapen. Ga naar uw arts of apotheker als u wilt stoppen met dit medicijn.

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- Verstopping. Drink veel water. Eet veel vezels, zoals groente, fruit en volkorenproducten. U kunt ook een laxermiddel gebruiken.
- Misselijk zijn, buikpijn en overgeven. Dit gaat meestal over als uw lichaam gewend is aan dit medicijn.
- Suf en slaperig zijn.

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers van dit medicijn krijgt last van:

- In de war zijn.
- Huiduitslag, jeuk, droge mond.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op kamertemperatuur en in de verpakking. Dit betekent dat u dit medicijn gewoon in huis of in uw medicijnkastje kunt bewaren.

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl en apotheek.nl of vraag uw arts of apotheker.